

APPENDICE : UN RESULTAT DE D. WILLIAMS

Williams vient de donner une réponse positive au problème posé à la fin de la section II.3 : le complémentaire de la << sphère >>  $W_1$  est effectivement  $\mu$ -polaire. Il se peut qu'il rédige lui même ce résultat, et ceci n'est qu'une rédaction provisoire.<sup>(4)</sup>

Nous fixons  $s$  dyadique, posons  $t_k^m = sk2^{-m}$ . La remarque cruciale de Williams est la suivante :

Si  $x$  est une fonction ( déterministe ) continue à valeurs dans  $\mathbb{R}^d$ , la variance de la somme

$$\sum_{k=0}^{2^m-1} (x^i(t_{k+1}^m) - x^i(t_k^m))(B_{t_{k+1}^m}^i - B_{t_k^m}^i) \text{ sous la loi } \mu,$$

vaut  $s2^{-m} \sum (x^i(t_{k+1}^m) - x^i(t_k^m))^2$ , majoré par  $s \cdot \sup_k (x^i(\cdot) - x^i(\cdot))^2$

Nous allons en déduire que, si  $x$  n'appartient pas elle même à  $W_1$ , la mesure  $P_t(x, \cdot)$  ne charge pas  $W_1$ .

Puisque  $x \notin W_1$ , il existe un  $s$  dyadique, et une composante  $i$ , une suite  $(p_m) \rightarrow \infty$  ( on écrira simplement  $p$  pour  $p_m$  ) tels que

$$\sum_{k=0}^{2^p-1} (x^i(t_{k+1}^p) - x^i(t_k^p))^2 \rightarrow \sigma \neq s \text{ ( } \sigma \text{ peut être } +\infty \text{ )}$$

Utilisant la majoration précédente, et la continuité uniforme de  $(x^i)$ , nous voyons que la variance écrite plus haut tend vers 0. Le lemme de Borel-Cantelli nous permet d'extraire une suite  $(q_m)$  de  $(p_m)$  telle que, en écrivant  $q$  au lieu de  $q_m$

$$\sum_{k=0}^{2^q-1} (x^i(\cdot) - x^i(\cdot))(B(\cdot) - B(\cdot)) \rightarrow 0 \text{ p.s.}$$

Mais alors, soit  $\omega$  la fonction  $e^{-t/2}x + \sqrt{1-e^{-t}}w$ , avec  $w \in W_1$ ; on a pour  $\mu$ -presque tout  $w \in W_1$

$$\lim \sum_{k=0}^{2^q-1} (B_{t_{k+1}}^i(\omega) - B_{t_k}^i(\omega))^2 = e^{-t}\sigma + (1-e^{-t})s \neq s$$

et par conséquent  $\omega \notin W_1$  ( $\mu$ -p.s. ).

Prenons maintenant comme loi initiale  $\mu$ , et supposons que le processus  $(Y_s)$  rencontre  $W_1^C$  avec probabilité positive entre 0 et  $t$ . Utilisant le théorème de section, il existe un temps d'arrêt  $T$  tel que  $T \leq t$ ,  $P\{T < t, Y_T e^{W_1^C}\} > 0$ . Par la propriété de Markov forte et le résultat précédent,  $P\{Y_t e^{W_1^C}\} \geq \int_{\{T < t, Y_T e^{W_1^C}\}} P_{t-T}(Y_T, W_1^C) = P\{T < t, Y_T e^{W_1^C}\} > 0$ , ce qui est absurde, puisqu'on sait que  $Y_t e^{W_1^C}$  p.s. ( résultat qu'on aurait d'ailleurs pu démontrer directement, par les mêmes considérations que ci-dessus ).

4. D. Williams a préféré laisser les choses ainsi. Nous le remercions d'avoir corrigé ce résultat au Séminaire.