

Erratum zu: Hygienemaßnahmen bei Infektionen oder Besiedlung mit multiresistenten gramnegativen Stäbchen

Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene
 und Infektionsprävention (KRINKO)
 beim Robert Koch-Institut (RKI)

Bundesgesundheitsbl, Gesundheitsforsch,
 Gesundheitsschutz (2012) 55:1311–1354
<http://dx.doi.org/10.1007/s00103-012-1549-5>

Im oben genannten Beitrag fehlt in **Tab. 5** „Maßnahmen zur Prävention der Verbreitung von MRGN“ eine Fußnote. Der Verweis „³“ zur Kohortenisolierung, der sich in der Legende unter der Tabelle befindet, gehört in die erste Zeile hinter das Wort „Isolierung“.

Die korrigierte Tabelle ist im Folgenden dargestellt.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Die Redaktion

Tab. 1 Maßnahmen zur Prävention der Verbreitung von MRGN

	Aktives Screening und Isolierung bis zum Befund ¹	Prävention der Übertragung		Sanierung
		Normalbereiche	Risikobereiche ^{1,2}	
3MRGN <i>E. coli</i>	Nein	Basishygiene	Isolierung ³	Nicht empfohlen
4MRGN <i>E. coli</i>	Risikopopulation ⁴ (Rektal, ggf. Wunden Urin)	Isolierung	Isolierung	Nicht empfohlen
3MRGN <i>Klebsiella spp</i>	Nein	Basishygiene	Isolierung	Nicht empfohlen
4MRGN <i>Klebsiella spp</i>	Risikopopulation (Rektal, ggf. Wunden Urin)	Isolierung	Isolierung	Nicht empfohlen
3MRGN <i>Enterobacter spp</i>	Nein	Basishygiene	Basishygiene	Nicht empfohlen
4MRGN <i>Enterobacter spp</i>	Risikopopulation (Rektal)	Isolierung	Isolierung	Nicht empfohlen
Andere 3MRGN Enterobakterien	Nein	Basishygiene	Basishygiene	Nicht empfohlen
Andere 4MRGN Enterobakterien	Risikopopulation ^d (Rektal)	Isolierung	Isolierung	Nicht empfohlen
3MRGN <i>P. aeruginosa</i>	Nein	Basishygiene	Isolierung	Nicht empfohlen
4MRGN <i>P. aeruginosa</i>	Risikopopulation (Rektal, Rachen)	Isolierung	Isolierung	Nicht empfohlen
3MRGN <i>A. baumannii</i>	Nein	Basishygiene	Isolierung	Ungeklärt
4MRGN <i>A. baumannii</i>	Risikopopulation (Mund-Rachen-Raum, Haut)	Isolierung	Isolierung	Ungeklärt

¹Risikobereichen sind nach individueller Risikoabwägung, z. B. auf Basis des Patientengutes und baulich struktureller Gegebenheiten festzulegen, wobei Intensivstationen, inklusive der Neonatologie und hämatologisch-onkologische Stationen als Bereiche mit besonders gefährdeten Patienten gelten. ²In der Neonatologie kann bereits eine alleinige Resistenz gegenüber 3. Generations-Cephalosporinen bei bestimmten Erregern (wie zum Beispiel *K. pneumoniae*, *E. cloacae*, *S. marcescens*, *P. aeruginosa*, *Acinetobacter spp.*, *C. koseri*) interdisziplinäre Überlegungen zur Notwendigkeit einer krankenhaushygienischen Intervention nach sich ziehen. ³Eine gemeinsame Isolierung (Kohorten-Isolierung) kann nur für Patienten mit einem MRGN derselben Spezies mit gleichem Resistenzmuster erfolgen. ⁴Als Risikopatienten gelten Patienten mit kürzlichem Kontakt zum Gesundheitssystem in Ländern mit endemischem Auftreten und Patienten die zu 4MRGN positiven Patienten Kontakt hatten, d. h. im gleichen Zimmer gepflegt wurden