

## Luxation sous-talienne pure chez un footballeur

### Subtalar Dislocation in a Footballer

H. Ait Benali · R. El Zanati · M.S. Berrada

Reçu le 24 février 2014 ; accepté le 20 mai 2014  
© SFMU et Lavoisier SAS 2014



**Fig. 1** A : déformation de la région médiotarsienne  
B : aspect radiologique de la luxation sous-talienne pure interne

Un homme âgé de 22 ans sans antécédents, footballeur professionnel, a été victime d'un traumatisme du pied gauche à la suite d'un tackle avec pied bloqué contre le sol. L'examen aux urgences chirurgicales retrouvait une douleur avec impotence fonctionnelle, un œdème diffus du pied avec une déformation de la région médiotarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1A) ni lésion vasculaire ou nerveuse. La radiographie du pied montrait une luxation sous-talienne pure interne sans fracture associée (Fig. 1B). Une réduction a été réalisée en urgence sous anesthésie générale par la manœuvre d'arrache-botte. Le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire. Une immobilisation par botte plâtrée sans appui pendant six semaines a été réalisée suivie d'une rééducation. La luxation sous-talienne

complète est une lésion rare, surtout lorsqu'elle est pure. Elle se définit comme une luxation simultanée des articulations sous-taliennes et talonaviculaires sans fracture du col du talus [1]. Elle ne représente que 1 % de l'ensemble des luxations observées en traumatologie. Le traitement repose sur la réduction en urgence sous anesthésie générale, aucune ostéosynthèse n'est réalisée en principe. Le pronostic de ces luxations est relativement bon [1].

### Référence

1. Amar MF, Chbani B, Loudiyi D, et al (2009) Luxation sous-talienne pure (à propos d'un cas). *J Trauma Sport* 26:250–2