


Erratum a: Raccomandazioni per l'utilizzo della diagnostica molecolare in Allergologia

Danilo Villalta¹  · Elio Tonutti² · Nicola Bizzaro³ · Ignazio Brusca⁴ · Vittorio Sargentini⁵

Publicato online: 2 dicembre 2016
© Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio 2016

Erratum a: Riv Ital Med Lab (2016)
DOI [10.1007/s13631-016-0122-x](https://doi.org/10.1007/s13631-016-0122-x)

La versione originale di questo articolo conteneva un errore nella Fig. 2.

La Fig. 2 corretta è quella riportata qui di seguito.

L'articolo originale è stato corretto.




Fig. 2 Schema generale dell'algoritmo diagnostico molecolare in caso di apparente polisensibilizzazione ai test cutanei e/o *in vitro* ad allergeni alimentari. I marcatori di sensibilizzazione primaria e quelli di cross-reattività verranno scelti di volta in volta in base alle positività ottenute con gli estratti. *La ricerca dei CCD verrà eseguita in caso di positività dei test *in vitro*

La versione online dell'articolo originale può essere trovata al doi:[10.1007/s13631-016-0122-x](https://doi.org/10.1007/s13631-016-0122-x).

✉ D. Villalta
danilo.villalta@as5.sanita.fvg.it

- ¹ Allergologia e Immunologia Clinica, Ospedale "S. Maria degli Angeli", Pordenone, Italia
- ² Immunopatologia e Allergologia, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata, Udine, Italia
- ³ Laboratorio di Patologia Clinica, Ospedale San Antonio, Tolmezzo (UD), Italia
- ⁴ Laboratorio Analisi, Ospedale "Buccheri-La Ferla", Palermo, Italia
- ⁵ Laboratorio Analisi, P.T.P, Nuovo Regina Margherita, Roma, Italia