SUR LES RELATIONS RATIONNELLES

M.P. Schutzenberger

IRIA

I. Introduction

Nous faisons référence aux chapitres IX et XI du traité de S. Eilenberg ([1]) pour les résultats de base concernant les relations rationnelles $\rho : A^* \rightarrow B^*$ entre monoïdes libres et nous appelons une telle relation *fonctionnelle* ssi l'image $a\rho$ de chaque mot a de A^* est vide ($=0$) ou un singleton. Nous nous proposons d'établir la propriété suivante qui peut être considérée comme une modification d'un résultat banal concernant les séries rationnelles.

Propriété : Si la relation rationnelle $\rho : A^* \rightarrow B^*$ n'est pas une somme finie de relations rationnelles fonctionnelles il existe trois mots $a, a', h \in A^*$ tels que $\text{Card} ((ah^n a')\rho) \geq n+1$ pour chaque $n \in \mathbb{N}$.

Dans ce qui suit nous supposerons d'abord la relation ρ donnée par un transducteur au sens de Nivat ([2]), c'est à dire par un morphisme μ de A^* dans le semi-anneau des $Q \times Q$ matrices à entrées dans $\text{Rat}(B)$, où Q est un ensemble d'indice fini, et la règle que pour chaque mot a , la partie $a\rho$ de B^* est certaine entrée fixe (disons, l'entrée (q_-, q_+) de la matrice $a\mu$. En outre, on peut supposer que cette représentation est *réduite* en ce sens que pour chaque q de Q il existe des mots a, a' de A^* tels que $a\mu(q_-, q)$ et $a'\mu(q_-, q_+)$ soient non nuls. En effet s'il n'en était pas ainsi on pourrait, sans changer la valeur de ρ , remplacer par 0 les entrées des lignes et colonnes " q " dans toutes les matrices, et par conséquent, omettre q .

Sous cette hypothèse qui sera toujours faite désormais, il est clair que la propriété serait triviale si l'une des entrées de l'une des matrices génératrices $a\mu$ ($a \in A$) était une partie infinie du B^* . Nous supposerons donc aussi que toutes ces

entrées sont des parties *finies* de B^* . Une autre simplification peut encore être faite : comme l'énoncé ne dépend pas du nombre d'éléments de l_p (où l est comme d'usage l'élément neutre) nous supposons toujours que $l_p = 0$ ou $= 1$, ces deux cas correspondant respectivement aux hypothèses que les états distingués q_- et q_+ sont distincts ou confondus.

II. Preuve de la propriété

Nous notons $||x||$ le nombre d'éléments d'un ensemble X quelconque et en particulier nous posons $||Q|| = d$.

Lemme 1. La relation ρ est fonctionnelle ssi $||\alpha\rho|| \leq 1$ pour tous les mots a de longueur $|a|$ du plus égal à $L = 1 + 2d(d-1)$.

Preuve : Soit a un mot de longueur minimum $|a| = n$ parmi ceux pour lesquels $||\alpha\rho|| \geq 2$. Si l'une des matrices a'_μ ($a' \in A$) a une entrée qui n'est ni vide ni un singleton, l'hypothèse que μ est un transducteur *réduit* implique que $n \leq 1 + 2d(d-1)$, et le résultat est vérifié dans ce cas. Dans le cas contraire où chaque entrée de chacune des matrices génératrices a'_μ ($a' \in A$) est au plus un singleton, soit $a = a_1 a_2 \dots a_n$ ($a_i \in A$). Il existe une suite de $n-1$ paires (q_j, q'_j) d'indices ($1 \leq j \leq n-1, q_j \neq q'_j$) tels que posant $q_0 = q'_0 = q_-$, $q_n = q'_n = q_+$ et $b_j = a_j \mu (q_{j-1}, q_j)$, $b'_j = a_j \mu (q'_{j-1}, q'_j)$ ($1 \leq j \leq n$) les mots $b = b_1 \dots b_n$ et $b' = b'_1 \dots b'_n$ soient deux éléments *distincts* de $\alpha\rho$. Supposons que $n > L$ et montrons que l'hypothèse de minimalité sur $|a| = n$ conduit à une contradiction.

D'après $L = 1 + 2d(d-1)$ il existe trois indices $i < j < k$ pour lesquels $(q_i, q'_i) = (q_j, q'_j) = (q_k, q'_k)$, ce qui détermine une factorisation $a = f_1 f_2 f_3 f_4$ où $f_1 = a_1 \dots a_i$; $f_2 = a_{i+1} \dots a_j$; $f_3 = a_{j+1} \dots a_k$; $f_4 = a_{k+1} \dots a_n$ et induit de façon évidente les factorisations correspondantes $b = g_1 g_2 g_3 g_4$ et $b' = g'_1 g'_2 g'_3 g'_4$. Par construction on a les inclusions $g_1 g_4, g'_1 g'_4 \in (f_1 f_4)_\rho$ et $g_1 g_x g_4, g'_1 g'_x g'_4 \in (f_1 f_x f_4)_\rho$ ($x = 2$ ou 3).

En raison du caractère minimal de a , les membres de droite sont des singletons et on a donc les trois équations $g_1 g_4 = g'$ et $g_1 g_x g_4 = g'_1 g'_x g'_4$.

Supposant, par exemple, que $|g_1| \leq |g'_1|$ il en résulte l'existence d'un mot h tel que $g'_1 = g_1 h$ et $g_4 = h g'_4$, d'où en reportant dans les autres équations et en simplifiant, les deux équations $h g_2 = g'_2 h$ et $h g_3 = g'_3 h$.

Il en résulte que

$b = g_1 g_2 g_3 g_4 = g_1 g_2 g_3 h g'_4 = g_1 g_2 h g'_3 g'_4 = g_1 h g'_2 g'_3 g'_4 = h g'_1 g'_2 g'_3 g'_4 = b'$
en contradiction avec l'hypothèse que b et b' étaient distincts.

Par conséquent $n \leq L$.

Q.E.D.

Nous rappelons maintenant que le support $\text{supp } \mu$ d'une $Q \times Q$ matrice μ est la relation binaire sur Q définie par l'ensemble de ses entrées non vides. Autrement dit, μ est un morphisme du monoïde $A^* \mu$ dans un monoïde de relations binaires sur Q . On dit que μ est *irréductible* ssi l'union des relations $a\mu$ ($a \in A^*$) est égale à $Q \times Q$ lui-même. Nous avons donc le

Corollaire 2. Quand μ est irréductible et que ρ n'est pas fonctionnelle, il existe trois mots a, h, a' tels que $\| (ah^n a') \rho \| \geq n+1$ ($n \in \mathbb{N}$).

Preuve : Supposons que $\|a\mu\| \geq 2$, c'est à dire que $\|a\mu(q_-, q_+)\| \geq 2$.

Puisque μ est irréductible il existe un mot a'' tel que (q_+, q_-) appartienne au support de la matrice $a''\mu$. Posant $h = a''a$ on a donc que l'entrée (q_-, q_+) de $h\mu$ contient au moins deux mots distincts. Il est trivial que la même entrée de $h^n \mu$ contient donc au moins $n+1$ mots distincts pour chaque $n \in \mathbb{N}$ et l'on a par conséquent $\| (ah^n) \rho \| = \| (ah^n) \mu (q_-, q_+) \| \geq n+1$ identiquement.

Q.E.D.

Par conséquent la propriété est déjà établie dans le cas particulier où le transducteur μ est irréductible. Comme elle l'est trivialement quand le domaine de ρ est fini nous pouvons désormais procéder par induction sur $\|Q\|$ ou plus exactement, sur le nombre total des entrées non nulles des matrices génératrices $a\mu$ ($a \in A$) du monoïde $A^* \mu$.

Avant de passer au cas général nous rappelons que le produit (de concaténation) de deux relations $\rho, \sigma : A^* \rightarrow B^*$ est la relation $\pi = \rho\sigma$ telle que pour chaque mot a on ait :

$$a\pi = \Sigma \{ (a'\rho) (a''\sigma) : a', a'' \in A^* ; a = a'a'' \}.$$

Supposons maintenant que μ ne soit pas irréductible. Il existe une partition $Q = Q' \cup Q''$ tel qu'aucun des supports $a\mu$ ne rencontre $Q'' \times Q'$. Nous définissons un morphisme μ' par la condition que pour tout $a \in A, q, q' \in Q$ on ait :

$$\begin{aligned} a\mu' (q, q') &= a\mu (q, q') \text{ si } q, q' \in Q' ; \\ &= 0 \quad \text{sinon ;} \end{aligned}$$

et un autre morphisme μ'' par la condition que $\mu = \mu' + \mu''$ et que le support des $a\mu''$ ne rencontre pas $Q' \times Q'$. On vérifie facilement que ρ est la somme étendue à tous les $q \in Q'$ des produits $\rho' \rho''$ où $\rho' = \mu' (q_-, q)$ et $\rho'' = \mu'' (q, q_+)$.

Ces relations sont rationnelles et on peut leur appliquer l'hypothèse d'induction. Donc pour conclure la preuve de la propriété il nous suffit de vérifier le **Lemme 3** : Si le produit $\pi = \rho\rho'$ de deux relations rationnelles fonctionnelles n'est pas une somme finie de telles relations, il existe trois mots pour lesquels $\| (ah^n a') \pi \| \geq n+1$ ($n \in \mathbb{N}$).

Preuve : Nous utilisons les bimachines de Eilenberg ([1], chap XI), c'est à dire que nous associons à ρ un morphisme ϕ de A^* dans un monoïde fini M et une application

partielle $\theta : M \times A \times M \rightarrow B^*$ telle que pour chaque mot $a = a_1 \dots a_n$ ($a_i \in A$) on ait que a_θ est le produit de $i = 1$ à $i = n$ de termes $(m'_i, a_i, m''_i)_\theta$ où m'_i (resp. m''_i) est l'image par ϕ du facteur gauche (resp. droit) de longueur $i-1$ (resp. $n-i$) de a . Une construction semblable avec $\phi' : A^* \rightarrow M'$ et θ' vaut pour ρ' . De fait, on peut remplacer M et M' par leur produit direct et, ceci fait, supposer simplement que $\phi = \phi'$, les deux bimachines ne différant alors que par leurs fonctions θ et θ' . On peut de plus exprimer ρ comme la somme sur tous les $s \in S$ des relations ρ_s qui sont définies comme la restriction de ρ à $s\phi^{-1}$. Il en est de même pour ρ' et il suffit donc d'établir le lemme sous l'hypothèse supplémentaire que le domaine de ρ est $s\phi^{-1} = D$ et que celui de ρ' est $s'\phi'^{-1} = D'$.

Le domaine de $\pi = \rho\rho'$ est donc DD' et l'on a que π est fonctionnelle quand chaque mot de A^* admet au plus une factorisation comme produit d'un mot de D par un mot de D' . Dans le cas contraire, l'ensemble des mots $p \neq 1$ satisfaisant les conditions $s'.p\phi = s'$ et $p\phi.s'' = s''$ est un sous semi groupe non vide P^+ de A^* (engendré par la base P) et chaque mot a de DD' admettant plusieurs factorisations admet une factorisation maximale unique $d p_1 p_2 \dots p_n d'$ où $n \geq 1$, $d \in D$, $d' \in D'$ et $p_1, \dots, p_n \in P$.

Nous étendons θ (et θ') à des fonctions de $M \times A^* \times M$ dans B^* par les identités :

$$(t, xy, t')_\theta = (t, x, y\phi, t')_\theta. (t, x\phi, y, t')_\theta$$

$$(x, y \in A^*, t, t' \in S, \theta'' = \theta \text{ ou } \theta').$$

Nous notons σ et σ' les relations rationnelles fonctionnelles de domaine P^+ envoyant respectivement chaque $p_i \in P^+$ sur $g_i = (s, p_i, s')_\theta$ et $g'_i = (s, p_i, s')_{\theta'}$.

On vérifie alors que a_θ est l'union pour $i = 0, 1, \dots, n$ des produits $bg_1 g_2 \dots g_i g'_{i+1} \dots g'_n b'$ où $b = (1, d, s')_\theta$ et $b' = (s, d', 1)_{\theta'}$. Ces $n+1$ mots sont les mêmes ssi $g_i = g'_i$ identiquement. Si au contraire $g = p\sigma \neq g' = p\sigma'$ (pour un $p \in P$) on voit que les $n+1$ mots de $\{a p^n a'\}_\rho$, c'est à dire les mots $d g^i g'^{n-i} d'$, ($0 \leq i \leq n$) sont tous distincts. Par conséquent les deux alternatives énoncées dans la propriété correspondent respectivement aux deux cas possibles selon que $\sigma \neq \sigma'$ ou $\sigma = \sigma'$. Nous observons maintenant que comme σ et σ' sont fonctionnelles, on a $\sigma = \sigma'$ ssi la relation rationnelle $\sigma + \sigma'$ l'est aussi, ce que l'on peut vérifier au moyen du lemme 1.

Q.E.D.

Remarque : Un examen plus détaillé des morphismes irréductibles permet de trouver des mots (s'il en existe) tels que $\text{Card}((ah^n a')_\rho) \geq 2^n$ ($n \in \mathbb{N}$) et, de vérifier que, sinon, $\text{Card}(a_\theta)$ est au plus égal à une fonction polynomiale de la longueur des mots a . ("cas polynomial").

Quand $\|a_\theta\|$ est bornée, on peut montrer que ρ est la somme d'une relation ayant un domaine fini et de d relations rationnelles fonctionnelles où d est le plus petit entier tel que a_θ contienne d mots distincts de B^* pour une infinité de mots a de A^* .

Donc pour deux relations de ce type, ρ et ρ' , on peut décider si l'on a ou non identiquement $a_\rho \subset a_{\rho'}$, et même si cette inclusion est vérifiée dans le complément d'une partie finie de A^* . Je présume qu'il en est de même dans le "cas polynomial" mais je ne suis pas parvenu à la démontrer.

Références :

- [1] S. Eilenberg. Automata languages and Machines vol. A
Academic Press N.Y. 1974.
- [2] M. Nivat (1968) Transductions des langages de Chomsky
Annales. Inst. Fourier. XVIII. pp. 335 - 455.