Sekundäre Pigmentveränderungen sind nach hämorrhagischem Trauma, Iridozyklitiden und nach intraokularen Eingriffen möglich.

Tumoren und Fehlbildungen

Irisknötchen unterschiedlicher Größe und Pigmentierungen sind typisch für die Neurofibromatose I. Brushfield-Flecken, typisch beim Down-Syndrom, sind immer unpigmentiert und limbusparallel auf der peripheren Iris gelegen. Selten ist das juvenile Xantogranulom, ein besonders für Kindheit und Jugend typischer Iristumor. Er äußert sich häufig durch eine spontane Blutung in die Vorderkammer Hyphäma).

Persistierende Pupillarmembran

Eine persistierende Pupillarmembran ist eine typische Hemmungsmissbildung, die mit der Iriskrause zusammenhängt.

Feinere Ausprägungsformen bestehen lediglich aus Fäden, die mikroskopisch sichtbar sind, größere Fehlbildungen aus Membranen, die oft mit einem vorderen Polstar der Linse zusammenhängen. Letztere bedürfen einer frühen Funktionsüberprüfung und augenärztlicher pleoptischer Begleitung. Eine ausreichend große Pupillaröffnung im Schachsenbereich sollte gewährleistet sein. Eine frühzeitige Exzision ist dann nicht erforderlich.

Literatur

► Kap. 252.

252 Pupille

E. Schulz

Anisokorie

Die Anisokorie ist eine Ungleichheit der Pupillenweite. Lokale Ursachen wie Sphinktereinrisse, Synechien und Irisatrophien sollten ausgeschlossen sein, ebenso pharmakologische Einflüsse. Eine geringe Anisokorie von ca. 1 mm Differenz kann physiologisch sein. Dabei reagieren beide Pupillen prompt, und die Lichtreaktion ist unauffällig.

Horner-Syndrom

Die pathologische Pupille ist die engere aufgrund einer Sympathikusstörung. Beide Pupillen reagieren auf Licht. Assoziierte Ptosis und Enophthalmus sind meist gering und imponieren als Gesichtssymmetrien. Diagnostisch beweisend ist der Kokaintest mit 5%igem Kokain (bei Säuglingen 2,5%ig): je 1 Trpf. wird in den Bindehautsack beider Augen gegeben, die Pupille der betroffenen Seite zeigt nach 20–40 min kaum eine Erweiterung. Kokain lässt keine Lokalisation innerhalb des Sympathikusverlaufs zu. Mit indirekten Adrenergika (Hydroxyamphetamin 1%, Pholedrin 5%, Thyramin 2,5%) werden gezielt Läsionen im 3. Neuron zwischen Ganglion cervicale und Auge nachgewiesen. Dies gilt wegen der transsynaptischen Degeneration nicht für das kongenitale Horner-Syndrom.

Pupillotonie

Bei Pupillotonie reagiert die Pupille sehr langsam sowohl auf Licht als auch bei der Konvergenz. Ebenso langsam erfolgt eine Erweiterung. Bei einseitiger Ausprägung ist die pathologische Pupille je nach Ausgangssituation enger oder weiter. Die betroffene Seite reagiert überempfindlich und kontrahiert sich auf gering konzentrierte (0,1%) Pilocarpin-Augentropfen in den Bindehautsack. Die normale Pupille wird davon nicht beeinflusst. Eine Pupillotonie findet sich nach Entzündungen des Ganglion ciliare, bei Adie-Syndrom und bei der familiären Dysautonomie.

Efferente Pupillenstörung

Eine einseitig weite, nicht reagible Pupille beim gesunden Kind ist verdächtig auf pharmakologische Kontamination mit z. B. Atropin. Eine innere Okulomotoriusparese ist differenzialdiagnostisch zu erwägen. Die pharmakologische Reaktion auf 0,5- bis 1,0%ige Pilocarpin-Augentropfen ist bei Letzterer erhalten. Der Test sollte nur in Ausnahmefällen angewandt werden, keinesfalls bei Patienten mit Verdacht auf akuten intrakraniellen Prozess, da hiermit die Pupillenreaktion als wichtiger Indikator längerfristig nicht mehr zur Verfügung steht.

Leukokorie

Die Leukokorie beschreibt einen unnatürlich hellen Weißreflex der Pupille im regredienten Licht. Ursache sind Trübungen in Linse und Glaskörper bis hin zu organisierten Massen im Glaskörper, z. B. nach Blutungen, bei exsudativer Retinopathie, im fortgeschrittenen Narbenstadium der Frühgeborenenretinopathie und beim Retinoblastom. Ein heller Fundusreflex ist aber auch bei ausgeprägtem Netzhautaderhautkolobom, großen atrophischen chorioretinalen Narben und ausgeprägten markhaltigen Nervenfasern möglich.

Literatur

- Huber A, Kömpf D (1998) Klinische Neuroophthalmologie. Thieme, Stuttgart
- Kommerell G (2004) Störungen der Pupillenmotorik. In: Kaufmann H (Hrsg) Strabismus. Thieme, Stuttgart
- Naumann GOH (1997) Pathologie des Auges, Bd 2. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo
- Wilhelm H (1991) Pupillenreaktionen – Pupillenstörungen. Kohlhammer, Stuttgart
- Schiefer U, Wilhelm H, Zrenner E, Burk A (2003) Praktische Neuroophthalmologie. Kaden, Heidelberg