Indometacin

C. Vidal¹ und W.-R. Külpmann²

¹Landeskriminalamt Niedersachsen, Dezernat 53 „Chemie“, Hannover, Deutschland

²Hannover, Deutschland

Englischer Begriff indometacin

Definition Analgetikum aus der Gruppe der nichtsteroidalen Antirheumatika.

Strukturformel:

Molmasse 357,80 g.

Synthese – Verteilung – Abbau – Elimination Die Resorption von Indometacin erfolgt rasch und vollständig bei oraler sowie rektaler Gabe. Die Proteinbindung beträgt 90–93 %. Die Substanz wird sowohl renal als auch biliär eliminiert.

Halbwertszeit 3–11 Stunden (Plasma).

Pathophysiologie Indometacin wird vorwiegend bei rheumatischen Erkrankungen, zur Behandlung der episodischen und chronischen paroxysmalen Hemikranie sowie beim akuten Gichtanfall eingesetzt. Eine Zunahme der Nebenwirkungen (Magen-Darm-Störungen, Kopfschmerz, Schwindel, psychische Veränderungen, Übelkeit) wird bei chronischer Gabe beschrieben und erfordert das Absetzen der Substanz.

Untersuchungsmaterial Serum (S), Plasma (P), Urin.

Analytik HPLC, GC-MS, LC-MS/MS.

Diagnostische Wertigkeit Therapeutischer Bereich (S, P): 0,3–3,0 mg/L; toxisch: >5 mg/L; komatös-letal: >100 mg/L.

Literatur

- König H, Hallbach J (2009) Nonopioid analgesics and antirheumatics. In: Külpmann WR (Hrsg) Clinical toxicological analysis. Wiley-VCH, Weinheim, S 189–214
- Moffat AC, Osselton MD, Widdop B (Hrsg) (2004) Clarke's analysis of drugs and poisons, 3. Aufl. Pharmaceutical Press, London/Chicago, S 1133–1135