Kidney injury molecule-1

A. M. Gressner¹ und O. A. Gressner²

¹Labor Dr. Wisplinghoff Berlin, Berlin, Deutschland

²Labor Dr. Wisplinghoff Köln, Köln, Deutschland

Synonym(e) KIM-1

Englischer Begriff human kidney injury molecule-1

Definition KIM-1 ist ein in dedifferenzierten und regenerierenden proximalen Tubulusepithelzellen der geschädigten Niere exprimiertes Typ-I-transmembranöses Glykoprotein, dessen Konzentration in Blut und Urin bei akuten und chronischen toxischen sowie ischämischen Tubulusschädigungen diagnostisch relevant ansteigt.

Beschreibung Die extrazelluläre Domäne (Ektodomäne) von KIM-1 besteht aus einer Immunglobulin-ähnlichen Domäne, die eine lange Muzin-ähnliche Domäne bedeckt und auf deren Funktion bei der Zelladhäsion und Vermittlung der Phagozytose in der geschädigten Niere hinweist. In Tubulus-

epithelzellen der gesunden Niere ist KIM-1 nicht nachweisbar, aber stark exprimiert bei ischämischen und toxischen Tubulusschädigungen/-nekrosen. Die freigesetzte Ektodomäne ist in Urin und Serum/Plasma bei akuten und chronischen Nephropathien (z. B. IgA-Nephropathie), Transplantatabstoßung und toxischen Nephropathien mittels ELISA (► [Enzyme-linked Immunosorbent Assay](#)) messbar. Die Kenngröße besitzt eine hohe diagnostische Sensitivität (► [Sensitivität, diagnostische](#)) und Spezifität (► [Spezifität, diagnostische](#)). Der klinische Einsatz kann in Verbindung mit Biomarkern ähnlicher Indikation wie ► [Neutrophilen-Gelatinase-assoziiertes Lipocalin](#) (NGAL), ► [Cystatin C](#) und Interleukin-18 erfolgen.

Literatur

- Devarajan P (2011) Biomarkers for the early detection of acute kidney injury. *Curr Opin Pediatr* 23:194–200
- Tummalaipalli L, Nadkarni GN, Coca SG (2016) Biomarkers for predicting outcomes in chronic kidney disease. *Curr Opin Nephrol Hypertens* 25(6):480–486