LUC

H. Baum

Institut für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Blutdepot, Regionale Kliniken Holding RKH GmbH, Ludwigsburg, Deutschland

Synonym(e) [Large unstained cells](#)

Englischer Begriff large unstained cells

Definition Im Peroxidasekanal des ADVIA 120-Blutanalyzers nicht anfärbbare, große Zellen.

Beschreibung Die Differenzierung der Leukozyten erfolgt im ADVIA 120 in verschiedenen Kanälen. Zur Differenzierung der neutrophilen und eosinophilen Granulozyten wird

deren Gehalt des Enzyms ► [Myeloperoxidase](#) herangezogen. In der zweidimensionalen Darstellung (Leukogramm) sind diese dann abgrenzbar, wobei die neutrophilen Granulozyten als Myeloperoxidase-positive und im Streulicht als große Zellen imponieren. Zellen, die an Hand ihrer Größe ein gleiches Streulichtsignal haben wie neutrophile Granulozyten, aber Myeloperoxidase negativ sind, werden dementsprechend als „große, nicht gefärbte Zellen“ oder als „large unstained cells“ (LUC) bezeichnet.

Diese LUC können verschiedenen Populationen angehören. Differenzialdiagnostisch kommen große Lymphozyten (► [Lymphozyt](#)), lymphozytäre Reizformen, ► [Lymphoblasten](#) und ► [Myeloblasten](#) sowie hämatopoetische Stammzellen infrage. In seltenen Fällen kann auch ein Defekt in der Myeloperoxidase der neutrophilen Granulozyten Ursache sein. Werden mehr als 4,5 % LUC detektiert, muss eine morphologische Differenzierung durchgeführt werden.