Mischfeldagglutination

K. Kleesiek¹, C. Götting², J. Diekmann³, J. Dreier⁴ und M. Schmidt⁵

¹Ehemaliger Direktor des Instituts für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin, Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen Ruhr-Universität Bochum, Bad Oeynhausen, Deutschland

²MVZ Labor Limbach Nürnberg GmbH, Nürnberg, Deutschland

³Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin, Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, Deutschland

⁴Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen; Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin, Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum, Bad Oeynhausen, Deutschland

⁵Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin, Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum, Bad Oeynhausen, Deutschland

Englischer Begriff mixed field agglutination

Definition Mikroskopischer Nachweis von zum Teil agglutinierten und freien Zellen in einer Zellsuspension von Erythrozyten, die mit antierythrozytären Antikörpern inkubiert wurden (► [Agglutinationstest](#)). Die Mischfeldagglutination wird in der Immunhämatologie verwendet, um erste Hinweise über Erythrozytenpopulationen und Natur des Antikörpers zu bekommen.

Funktion Mischfeldagglutinationen werden beobachtet, wenn 2 phänotypisch unterschiedliche Populationen von Erythrozyten

in der Zellsuspension vorhanden sind, z. B. ein Patient mit der Blutgruppe A die Transfusion eines Erythrozytenkonzentrats der ► [Blutgruppe](#) 0 erhalten hat oder im Blut schwangerer Frauen fetale Erythrozyten nachweisbar sind. Eine exzellente Methode, um das Vorhandensein zweier unterschiedlicher Erythrozytenpopulationen zu zeigen, ist die Säulenagglutinationstechnik (► [Säulenagglutinations-Test](#)). In dieser Technik verbleibt eine Erythrozytenpopulation auf der Säulenoberfläche, die andere bedeckt deren Boden.

Darüber hinaus wird eine Mischfeldagglutination auch in phänotypisch singulären Erythrozytensuspensionen gefunden, wenn die Erythrozyten eine relativ geringe Antigendichte (z. B. bei einer schwachen Variante der Blutgruppe A) besitzen oder der Antikörper nur einen sehr geringen Titer aufweist. So findet man bei Lutheran-Antikörpern (► [Lutheran\(LU-\)Blutgruppensystem](#)) eine charakteristische Mischfeldagglutination mit großen Agglutinaten und vielen frei suspendierten Erythrozyten. Der diagnostische Hinweis einer Mischfeldagglutination muss immer durch weitere Methoden geprüft werden. Beispielsweise wenn die Erythrozytensuspension einer schwangeren Rh-negativen Frau aufgrund der Anwesenheit zirkulierender fetaler Erythrozyten eine Mischfeldagglutination zeigt und dies ohne weiteren methodischen Beleg für das Vorliegen des Rh-Merkmals Dweak gehalten wird.

Literatur

- Kiefel V(Hrsg) (2010) Transfusionsmedizin: Grundlagen – Therapie – Methodik, 4. Aufl. Springer, Berlin/Heidelberg/New York
Klein HG, Anstee DJ (2014) Blood transfusion in clinical medicine, 12. Aufl., first edition by Mollison. Blackwell Publishing, London