Q

Quetiapin

C. Vidal¹ und W.-R. Külpmann²

¹Landeskriminalamt Niedersachsen, Dezernat 53 „Chemie“, Hannover, Deutschland

²Hannover, Deutschland

Englischer Begriff quetiapine

Definition Neuroleptikum.

Strukturformel:

Molmasse 383,5 g.

Synthese – Verteilung – Abbau – Elimination. Nach oraler Applikation wird Quetiapin rasch enteral resorbiert. Die maximale Plasmakonzentration wird 1,5–2 Stunden nach Gabe erreicht. Das Pharmakon wird hepatisch weitgehend metabolisiert (Oxidation, Hydroxylierung). Die Abbauprodukte werden im Urin (73 % der Dosis) und mit den Fäzes (20 % der Dosis) ausgeschieden. Nur 1 % der Muttersubstanz wird unverändert renal eliminiert.

Halbwertszeit 7 Stunden.

Funktion – Pathophysiologie Das mit ► [Clozapin](#) chemisch verwandte Quetiapin wird zur Behandlung von Psychosen eingesetzt. Es besitzt eine hohe Affinität zu Serotonin-Rezeptoren. Bei Intoxikation finden sich Schläfrigkeit, Tachykardie und Hypotonie.

Untersuchungsmaterial – Entnahmebedingungen Serum (S), Plasma (P).

Analytik ► [Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie](#), LC-MS/MS.

Indikation Verdacht auf Intoxikation, therapeutisches Drug Monitoring (Prüfung auf Compliance).

Interpretation Therapeutischer Bereich (S, P): 0,1–0,5 mg/L; toxisch: ab 1 mg/L (Hiemke et al. [2012](#)); komatös/letal: ab 12,7 mg/L (Degel et al. [2009](#)).

Literatur

- Degel F, Birkhahn HJ, Lampe D, Grobosch T (2009) Neuroleptic drugs and antidepressants. In: Külpmann WR (Hrsg) Clinical toxicological analysis. Wiley-VCH, Weinheim, S 393–453
- Hiemke C et al (2012) AGNP-Konsensus-Leitlinien für therapeutisches Drug-Monitoring in der Psychiatrie: Update 2011. Psychopharmakotherapie 19:91–122