Apolipoprotein A-I

K. J. Lackner¹ und D. Peetz²

¹Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland

²Institut für Labormedizin, Helios Klinikum Berlin-Buch, Berlin, Deutschland

Synonym(e) ApoA-I

Englischer Begriff apolipoprotein A-I

Definition Hauptapolipoprotein der High Density Lipoproteine (HDL; s. ► [High Density Lipoprotein](#)).

Struktur 243 Aminosäuren; geringe, nicht vollständige posttranslationale Modifikation durch Acylierung und Phosphorylierung.

Molmasse 28,4 kDa.

Halbwertszeit 3,5–5 Tage.

Funktion – Pathophysiologie HDL und insbesondere ► [Prä-β1-HDL](#) gilt als wichtiges Akzeptorpartikel für zelluläres ► [Cholesterin](#). Insgesamt ist ApoA-I neben ApoE das für den Transport von überschüssigem Cholesterin aus der Peripherie zur Leber wichtigste Apolipoprotein. Defekte im ApoA-I-Gen führen zu vollständigen HDL-Defizienzen oder verminderten HDL-Cholesterin-Konzentrationen und erhöhen damit das Atheroskleroserisiko.

Untersuchungsmaterial – Entnahmebedingungen Serum, EDTA- oder Heparinplasma.

Analytik ► [Immunturbidimetrie](#), ► [Immunnephelometrie](#), ► [Enzyme-linked Immunosorbentassay](#) (nur bei sehr niedrigen Werten).

Konventionelle Einheit mg/dL.

Internationale Einheit g/L.

Umrechnungsfaktor zw. konv. u. int. Einheit 1:100.

Referenzbereich – Frauen 100–210 mg/dL (nur orientierend, da stark methodenabhängig).

Referenzbereich – Männer 90–180 mg/dL (nur orientierend, da stark methodenabhängig).

Referenzbereich – Kinder Keine validen Angaben; aber außer in der Neugeborenenphase nicht grundsätzlich verschieden von den Erwachsenenwerten.

Indikation Differenzialdiagnose von Veränderungen der HDL-Konzentration, v. a. HDL-Defizienzen; ansonsten klinisch keine zusätzliche Information zum HDL-Cholesterin.

Interpretation ApoA-I-Konzentrationen bieten gegenüber dem HDL-Cholesterin keine zusätzliche Information. Bei HDL-Mangelsyndromen kann die ApoA-I-Konzentration Hinweise auf die Ursache geben (vollständiges Fehlen oder starke Verminderung).

Diagnostische Wertigkeit Zusätzlich zum HDL-Cholesterin gering.

Literatur

Schwandt P, Richter O, Parhofer KG (2007) Handbuch der Fettstoffwechselstörungen, 3. Aufl. Schattauer Verlag, Stuttgart