R

Radioenzymassay (REA)

W. Hubl

Ehem. Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Institut für
Klinische Chemie und Labormedizin, Dresden, Deutschland

Synonym(e) REA; Radioenzymatische Bestimmung; Radioenzymatischer Assay

Englischer Begriff radioenzymatic assay

Definition Beim Radioenzymassay (REA) wird eine radioaktiv markierte funktionelle Gruppe, z. B. eine Methylgruppe, mithilfe eines Enzyms auf die zu bestimmende Substanz (Analyt) übertragen. Nach Reinigung und Auftrennung der radioaktiven Endprodukte wird das isolierte Endprodukt des Analyten mit einem Messgerät für die verwendete Radioaktivität, z. B. Gamma- bzw. Beta-Zähler, quantitativ bestimmt.

Beschreibung Eine häufige Anwendung des REA lag in der Zeit vor den direkten Immunoassays bzw. den heutigen HPLC-Verfahren im Einsatz zur Bestimmung der Katecholamine. Hierbei erfolgte die radioenzymatische Methylierung

mittels der Catechol-O-Methyltransferase (COMT). Die Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin wurden dabei in die Metanephrine umgewandelt und radioaktiv gemessen. Über Standardkurven wurden die Ausgangsprodukte Adrenalin und Noradrenalin quantitativ bestimmt. Ein weiteres Anwendungsgebiet des REA war beispielsweise die Bestimmung von ► **Carnitin** im Rahmen des Fettsäurenmetabolismus.

Heute besitzt der REA keine Praxisrelevanz mehr, weil zahlreiche neue Verfahren eingeführt wurden (Immunoassay, HPLC-MS), die eine bedeutend höhere diagnostische Relevanz besitzen.

Literatur

- Barth A (1984) Comparative evaluation of two radioenzymatic procedures designed to determine noradrenaline in the plasma (COMT assay and PNMT assay) Dissertation, Universität Köln, Medizinische Fakultät
- Kennedy B, Ziegler MG (1990) A more sensitive and specific radioenzymatic assay for catecholamines. *Life Sci* 47:2143–2153
- Vomez L (2005) Analysis of carnitine and acylcarnitines in biological fluids and application to a clinical study. Dissertation, Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Genf