R

Reststickstoff

G. Töpfer
Schöpstal, Deutschland

Synonym(e) Rest-N

Englischer Begriff non protein nitrogen

Definition Die nach Enteiweißung des Serums oder Plasmas (Liquor, Urin) mit Trichloressigsäure in das Filtrat gehenden Stickstoffverbindungen – in erster Linie ► [Harnstoff](#), ► [Aminosäuren](#), ► [Harnsäure](#), Peptide, ► [Kreatinin](#), Kreatin, Ammoniak, Phenole und ► [Bilirubin](#) – werden nach Kjeldahl (► [Kjeldahl-Methode](#)) mit Schwefelsäure und Selendioxyd verascht und das Ammoniak nach Freisetzen mit konzentrierter Lauge aus dem Reaktionsgemisch abdestilliert, in 2 %iger Borsäure aufgefangen und mit 0,01 M Schwefelsäure gegen einen Mischindikator titriert.

Beschreibung Historische Methode (bis in die 1970er-Jahre verwendet), um die nach Ausfällung der Proteine im Plasma verbleibenden geringen Stickstoffanteile zu analysieren, wobei die Hälfte des Reststickstoffs aus dem Harnstoff kommt. Der überwiegende Teil gehört zu den Schlackenstoffen, obwohl auch wertvolle Substrate zum Reststickstoff gehören, wie Peptide und ► [Aminosäuren](#).

Die Zusammensetzung des Reststickstoffs ist in der folgenden Tabelle gezeigt.

	Anteil in (mg N/100 mL)
Rest-N gesamt	26
Harnstoff	13
freie Aminosäuren	6
Peptide	1,2
Harnsäure	1,5
Kreatinin	0,5
Kreatin	0,2
Ammoniak	0,1
Phenole	
Bilirubin	

Im Wesentlichen führen Erhöhungen von ► [Harnstoff](#), ► [Kreatinin](#) und ► [Harnsäure](#) zur Erhöhung des Reststickstoffs. Infolgedessen war früher die Hauptindikation für die Bestimmung im Plasma die Fragestellung Urämie.

Literatur

- Richterich R (1965) Klinische Chemie. Karger, Basel/New York, S 197
Winkler L (1975) Klinische Biochemie. Verlag Volk und Gesundheit, Berlin, S 434–435