R

Retikulozytenhämoglobin

H. Baum

Institut für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Blutdepot, Regionale Kliniken Holding RKH GmbH, Ludwigsburg, Deutschland

Synonym(e) CHr; Ret-H_c

Englischer Begriff reticulocyte cell haemoglobin content; reticulocyte haemoglobin

Definition Mittlerer Hämoglobingehalt der Retikulozyten.

Beschreibung Der Hämoglobingehalt des Einzelerythrozyten (► [Erythrozyten-Indices](#)) verändert sich nicht während des Lebenszyklus vom Retikulozyten (► [Retikulozyt](#)) zum reifen Erythrozyten. Aus den Streulichteigenschaften der Retikulozytenpopulation kann auf den mittleren Hämoglobingehalt der Retikulozyten geschlossen werden.

Beim Gesunden beträgt dabei das Verhältnis des mittleren Hämoglobingehaltes der Retikulozyten (Ret-H_c oder CHr) und des MCH ca. 1:1. Der Parameter gibt also eine Momentaufnahme der aktuellen erythropoetischen Leistungsfähigkeit des Knochenmarks wieder. In Kombination mit den Parametern löslicher Transferrinrezeptor (► [Transferrinrezeptor, löslicher](#)) und ► [Ferritin](#) kann das Retikulozytenhämoglobin zur Differenzierung des Eisenstatus bei Anämiepatienten und zum Therapiemonitoring der renalen Anämie unter Therapie mit ► [Eisen](#) und/oder ► [Erythropoetin](#) eingesetzt werden.

Literatur

- Brugnara C (2000) Reticulocyte cellular indices: a new approach in the diagnosis of anemias and monitoring of erythropoietic function. *Crit Rev Clin Lab Sci* 37:93–130
- Thomas C, Thomas L (2002) Biochemical markers and hematologic indices in the diagnosis of functional iron deficiency. *Clin Chem* 48:1066–1076