R

Ringsideroblasten

H. Baum

Zentrum für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie,
Blutdepot und Krankenhaushygiene, Regionale Kliniken
Holding RKH GmbH, Ludwigsburg, Deutschland

Englischer Begriff ring sideroblast

Definition Kernhaltige erythrozytäre Vorstufe mit in der Berlinerblau-Färbung nachweisbaren Siderosomen, die den Kern mindestens zu einem Drittel oder ringförmig umgeben.

Beschreibung Ringsideroblasten sind kernhaltige erythropoetische Vorstufen, bei denen in der ► **Berlinerblau-Reaktion** meist etwa 10–15 eisenhaltige Körperchen (Siderosomen) nachweisbar sind. Dabei liegen diese Siderosomen mindestens zu einem Drittel oder vollständig kreisförmig um den Kern der Zelle.

Die Abbildung zeigt einen Ringsideroblasten (*Pfeil*) mit typischer ringförmiger Lagerung der Siderosomen um den Zellkern (1000×, Berlinerblau-Färbung):

Der Nachweis von Ringsideroblasten ist ein Hinweis auf eine gestörte Erythropoese, wobei in erster Linie an eine refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten (RARS) zu denken ist. Seltener sind hereditäre (Thalassämien) oder exogene (Ethylismus, Bleiintoxikation) Erkrankungen Ursache für das Vorkommen von Ringsideroblasten.

Literatur

Löffler H, Rastetter J (1999) Atlas der klinischen Hämatologie, 5. Aufl. Springer, Berlin/Heidelberg/New York, S 10–11