S100A12-Protein

A. M. Gressner¹ und O. A. Gressner²

¹Labor Dr. Wisplinghoff Berlin, Berlin, Deutschland

²Labor Dr. Wisplinghoff Köln, Köln, Deutschland

Synonym(e) [Calgranulin-C](#); [neutrophiles S100-Protein](#)

Englischer Begriff S100A12 protein

Definition Polypeptid der S100/Calgranulin-Familie von proinflammatorischen Zytokinen.

Beschreibung Die Exon-Intron-Struktur des S100A12-Gens ähnelt denen der meisten anderen S100-Gene (3 Exons, 2 Introns; Codierung durch Exon 2 und 3).

Als Sekretionsprodukt bindet S100A12 gemeinsam mit S100B, und S100A8/A9 an lösliches RAGE (► [Receptor of advanced glycation end-products](#)) und weitere Rezeptoren auf inflammatorischen, epithelialen und neuronalen Zellen, wodurch es proinflammatorisch wirkt. S100A12 wird in entzündlich veränderten Geweben, insbesondere an Stellen vaskulärer Läsionen, vermehrt gefunden und wirkt hier expressionssteigernd auf RAGE. Die Serumkonzentrationen korrelieren mit der Entzündungsaktivität.

Literatur

Wicki R et al (1996) Characterization of the human S100A12 (calgranulin C, p6, CAAF1, CGRP) gene, a new member of the S100 gene cluster on chromosome 1q21. *Cell Calcium* 20:459–464