Siderozyten

H. Baum

Institut für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Blutdepot, Regionale Kliniken Holding RKH GmbH, Ludwigsburg, Deutschland

Englischer Begriff siderocyte

Definition Erythrozyten mit in der Berlinerblau-Reaktion nachweisbaren eisenhaltigen Granula.

Die Abbildung zeigt 2 Siderozyten (*Pfeile*) im peripheren Blut (1000×, Berlinerblau-Färbung):

Beschreibung Siderozyten sind ► **Erythrozyten**, in denen mit der ► **Berlinerblau-Reaktion** meist 1–4 kleine Granula (► **Pappenheim-Körper**) nachweisbar sind. Es handelt sich dabei um nicht an ► **Hämoglobin** gebundenes ► **Eisen** (Siderosome). Der Nachweis einer Vermehrung der Siderozyten im peripheren Blut >3 % deutet auf eine Eisenverwertungsstörung hin und kann vor allem bei Alkoholikern, schweren Infekten, nach Milzexstirpation und bei einer refraktären Anämie mit Ringsideroblasten (RARS) gefunden werden.

Literatur

Enne W (1993) Zellen der Erythropoese. In: Begemann H, Rastetter J (Hrsg) Klinische Hämatologie, 4. Aufl. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, S 36–37