State-Marker

T. Arndt

Bioscientia Institut für Medizinische Diagnostik GmbH,
Ingelheim, Deutschland

Definition Sammelbegriff für zustands- und zeitabhängige Kenngrößen eines bestimmten physiologischen oder pathologischen Prozesses.

Beschreibung Der Begriff findet innerhalb der Klinischen Chemie vor allem im Rahmen der Alkoholmissbrauchsdiagnostik Anwendung. Er umfasst, in Abgrenzung zum sog. ▶ **Trait-Marker**, all jene klinisch-chemischen Kenngrößen (▶ **Kenngröße, klinisch-chemische**), die einen akuten, kurz-

lich zurückliegenden oder chronischen Alkoholkonsum anzeigen, z. B. ▶ **Ethanol** in Blut, ▶ **γ-Glutamyltransferase**, ▶ **Carbohydrate-deficient transferrin** in Serum und ▶ **Ethylglukuronid** in Urin und Haaren. S. auch ▶ **Alkoholmissbrauchskenngrößen**. State-Marker sind für alle physiologischen und pathobiochemischen Zustände definierbar. Für den Diabetes mellitus sind z. B. die Glukosekonzentration in NaF-Serum oder das ▶ **Hämoglobin A1C** im EDTA-Blut State-Marker.

Literatur

Arndt T (2011) Biomarker des Alkoholkonsums – eine Übersicht. Toxi-chem Krimtech 78:419–430