Tyramin

A. M. Gressner¹ und O. A. Gressner²

¹Labor Dr. Wisplinghoff Berlin, Berlin, Deutschland

²Labor Dr. Wisplinghoff Köln, Köln, Deutschland

Synonym(e) 4-Hydroxy-Phenylethylamin

Englischer Begriff tyramine

Definition Im Rahmen hochgradiger Leberinsuffizienz mit hepatogener Enzephalopathie/Coma hepaticum kommt es zu einer intrazerebralen Konzentrationszunahme des biogenen Amins Tyramin, das aufgrund seiner indirekten sympathomimetischen Wirkung (Freisetzung von Noradrenalin [► [Katecholamine](#)]), Hemmwirkung auf die Noradrenalin-synthese und Präkursorfunktion für den falschen (inaktiven) Neurotransmitter ► [Oktopamin](#) Bedeutung in der Pathogenese der hepatogenen Enzephalopathie/Coma hepaticum hat.

Beschreibung Die Serumtyraminkonzentration ist bei leberzirrhotischen Patienten aufgrund eines vermehrten Anfalls durch bakterielle Decarboxylierung des Tyrosins (► [Tyrosin](#)) im Intestinaltrakt (s. Abbildung) und eines verminderten Abbaus in der Leber durch Monoaminoxidasen (► [Monoaminoxidase im Serum](#)) stark erhöht.

Entstehung von Tyramin durch intestinale bakterielle Decarboxylierung von Tyrosin:

Die Hypertyraminämie ist vermutlich an der Pathogenese der hepatischen Enzephalopathie/Coma hepaticum beteiligt aufgrund der indirekten sympathomimetischen Wirkung mit Freisetzung von Noradrenalin, der Hemmwirkung auf die Noradrenalin-synthese und der Präkursorfunktion des Tyramins für den falschen (inaktiven) Neurotransmitter Oktopamin. Konzentrationen im Serum sind bei Zirrhotikern ohne Enzephalopathie etwa 2-fach, bei denen mit Enzephalopathie etwa 5-fach erhöht. Diagnostisch hat die Tyraminbestimmung gegenüber Oktopamin keine Vorteile.

Tyramin/Oktopamin sind pathogenetisch auch in den Bereich Cluster-Kopfschmerz/Migräne eingebunden.

Literatur

Hilger W, Zitting A, Albrecht J (1985) The brain octopamine and phenylethanolamine content in rats in thioacetamide-induced hepatogenic encephalopathy. *Acta Neurol Scand* 71(3):195–198