Cholecystokinin

A. M. Gressner¹ und O. A. Gressner²

¹Labor Dr. Wisplinghoff Berlin, Berlin, Deutschland

²Labor Dr. Wisplinghoff Köln, Köln, Deutschland

Synonym(e) CCK; Pankreozymin; PZ

Englischer Begriff cholecystokinin; pancreozymin; CCK-PZ

Definition Ein in Dünndarm (Duodenum), Gehirn und Pankreas gebildetes, mit Pankreozymin identisches intestinales Polypeptidhormon mit stimulierender Wirkung auf die Gallenblasenkontraktion und Enzymsekretion des exokrinen Pankreas.

Beschreibung Das als Präpro-CCK gebildete, 33 ► [Aminosäuren](#) große, lineare Polypeptid wird in den I-Zellen der Mukosa des oberen Dünndarms (vorwiegend Duodenum), in Hirn und Pankreas synthetisiert. Identisch mit Pankreozymin, große Ähnlichkeit mit ► [Gastrin](#). Sekretionsstimuli sind intestinale Polypeptide und Aminosäuren (vorwiegend Tryptophan, Phenylalanin) von partiell verdauten Proteinen, Magensäure und längerkettige Fettsäuren (>9 Kohlenstoffatome, in Form von Mizellen). Kurzfristige postprandiale CCK-Erhöhung in der Zirkulation mit rascher Normalisierung, Halbwertszeit zwischen 2,5 und 5 Minuten.

Proteolytische Prozessierung führt zu strukturell heterogenen Formen (CCK-8, -33, -38, -59 Aminosäuren) mit jeweils gleichem C-terminalen Pentapeptid, das mit Gastrin identisch

ist. Volle biologische Wirkung ist mit CCK-8 gegeben und abhängig von Tyrosinsulfatierung in Position 7. Über die beiden G-Protein-gekoppelten Rezeptoren CCK-A (Molmasse 120 kDa und 80 kDa, vorwiegend Azinuszellen) und CCK-B (Molmasse 55 kDa, Magen-, Hirn- und ZNS-Lokalisation) werden folgende Wirkungen vermittelt:

- Stimulationen von Gallenblasenkontraktion und Gallesekretion
- Pankreatische Enzymsekretion und ► [Sekretin](#)-induzierte Wasser- und Bicarbonatsekretion
- Relaxation von Sphincter Oddi
- Stimulation der intestinalen Peristaltik
- Inhibition der Magenentleerung

Im Nüchternplasma sehr niedrige Konzentration von <80 ng/L (genauer Wert stark methodenabhängig). Analyt sehr instabil (eisgekühltes, Aprotinin-enthaltendes Heparin-Plasma).

Konzentrationserhöhungen bei exokriner Pankreasinsuffizienz, Zöliakie und Leberzirrhose, keine klinisch-diagnostische Relevanz. Pharmakologischer Einsatz von CCK-PZ im ► [Sekretin-Pankreozymin-Test](#) zur Diagnostik der exokrinen Pankreasinsuffizienz.

Literatur

Szelenyi Z, Szekely M, Hummel Z et al (2004) Cholecystokinin: possible mediator of fever and hypothermia. *Front Biosci* 9:301–308