Ciclosporin

C. Vidal¹ und W.-R. Külpmann²

¹Landeskriminalamt Niedersachsen, Dezernat 53 „Chemie“, Hannover, Deutschland

²Hannover, Deutschland

Synonym(e) Cyclosporin A

Englischer Begriff ciclosporine; cyclosporine; cyclosporin A

Definition Immunsuppressivum.

Molmasse 1203 g.

Synthese – Verteilung – Abbau – Elimination Nach Inkorporation wird Ciclosporin hepatisch mittels Zytochrom P450 3A zu mehr als 30 verschiedenen, nicht nur inaktiven Metaboliten abgebaut, die über die Galle ausgeschieden werden.

Halbwertszeit 15 Stunden (Erwachsene) (Plasma).

Funktion – Pathophysiologie Als unerwünschte Wirkungen treten auf: Nephrotoxizität, Hepatotoxizität, Muskelschwäche, Übelkeit und Hypertonie. Ciclosporin wirkt diabetogen.

Untersuchungsmaterial – Entnahmebedingungen EDTA-Vollblut.

Analytik ► **Immunoassay** (z. T. Erfassung von Metaboliten), HPLC (► **Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie**), LC-MS/MS (► **Chromatographie**, ► **Massenspektrometrie**).

Indikation Therapeutisches Drug Monitoring:

	Therapeutischer Bereich für Blut (mg/L)	
	Initialtherapie*	Erhaltungstherapie
Transplantat		
Niere	0,150–0,225	0,100–0,150
Leber	0,225–0,300	0,100–0,150
Herz	0,250–0,350	0,150–0,250

*Bis 3 Monate nach Transplantation

Interpretation Immunoassays sind unterschiedlich spezifisch und erfassen mehr oder weniger stark auch die Metabolite. Deren Anteil kann bei Störung der Gallenbildung/-ausscheidung ansteigen, wodurch die Beurteilung von Immunoassay-Resultaten zusätzlich erschwert ist.

Literatur

Armstrong VW, Schütz E, Oellerich M (1999) Drug monitoring nach Organtransplantation. In: Bruhn HD, Fölsch UR (Hrsg) Lehrbuch der Labormedizin. Schattauer Verlag, Stuttgart, S 124–131