Personen einen einheitlichen Verlauf und änderten sich nicht bei mehrmaliger Untersuchung. Dagegen wechselte bei Hungerödemkranken der Kurventyp bei jeder Fraktionierung. Zusätzliche Fällungsmaxima traten im Albuminbereich auf, während sie bei normalen Seren nicht zu finden waren. Diese Unterschiede im Verhalten gegen Neutralsalze, welche sich nur durch eine veränderte Beschaffenheit der Serumproteine erklären lassen, wurden nicht nur bei Ödemkranken, sondern auch bei anscheinend gesunden Männern beobachtet, welche die beschriebene Störung der Plasmaeiweißregulation aufwiesen.

6. F. HEIM (Marburg a. d. Lahn): Über den fermentativen Abbau von Adrenalin und adrenalinähnlichen Körpern.

Adrenalin und adrenalinähnlich gebaute Körper können an 2 Stellen des Moleküls fermentativ zu pharmakologisch unwirksameren Substanzen abgebaut werden, erstens durch Oxydation an den phenolischen OH-Gruppen des Rings und zweitens an der Seitenkette durch Desaminierung und gleichzeitige Oxydation. Die Oxydation am Ring geschieht durch Phenoloxidasen, an der Seitenkette durch die Aminooxydase. Sitzt die Methylamingrouppe am endständigen C-Atom der Seitenkette wie z. B. beim Adrenalin, Sympatol, Adrianol usw., so wird das Molekül leicht von der Aminooxydase desaminiert und oxydiert, sitzt sie nicht endständig, wie beim Suprifen, Veritol, Epedrin, Pervitin usw., so ist das Molekül für die Aminooxydase schwer angreifbar. Die letztgenannten Körper können jedoch die Aminooxydase noch in Konzentrationen bis zu 1:1000000 hemmen, in noch niedrigeren Konzentrationen können sie auf das Ferment aktivierend wirken. Es ist möglich, daß sowohl die sympathikotone Wirkung der Körper vom Typ des Veritol, Ephedrin und Pervitin ebenso wie ihre zentral erregende Wirkung nicht direkt, sondern über eine Hemmung des körpereigenen Adrenalins zustande kommt. Die Aminooxydase wird noch durch andere Pharmaka gehemmt. Aktivierend wirkt Ultraviolettbestrahlung.

Von den Phenolasen werden die Brenzkatechinabkömmlinge unter den Sympathikomimetika leicht oxydiert, die Körper ohne phenolische OH-Gruppe am Ring wie Ephedrin und Pervitin überhaupt nicht. Die Sympathikomimetika mit einer phenolischen OH-Gruppe sind für die Phenolasen leicht angreifbar, wenn sich in der Seitenkette keine Hydroxylgruppe befindet, dagegen werden sie nur schwer oder gar nicht oxydiert, wenn ein H-Atom am 1. C-Atom der Seitenkette durch eine OH-Gruppe ersetzt ist.

Diskussion: HEUBNER, GREMELS, KOLL.