Durch diese Befunde ist hinreichend gesichert, daß der Allylkoholabbau in diesem Test durch Cystein nicht gehemmt wird. SCHÖNS Hypothese, daß die Nekrosen durch Oxydationsprodukte des Allylkohols verursacht werden, dürfte somit nicht zutreffen.

Literatur

- EGER, W.: Virchows Arch. path. Anat. **328**, 536 (1956).
 EICKSTEDT, K. W. v.: Naunyn-Schmiedeberg's Arch. exp. Path. Pharmak. **238**, 54 (1950).
 — Arzneimittel-Forsch. **8**, 454 (1958).
 SCHÖN, H.: Pathologie, Diagnostik und Therapie der Leberkrankheiten. 4. Freiburg. Sympos., Hrsg. H. A. KÜHN, Berlin 1957.
 WALLENFELS, K., u. H. D. SUMM: Klin. Wschr. **35**, 849 (1957).

A. FISCHER, L. TAKÁCS u. ST. VARGA (Budapest): Intermediärer Stoffwechsel von Pharmaka auf Grund von Toxizitätsprüfungen an partiell hepatektomierten Ratten

Im folgenden soll eine relativ einfache Methode vorgeschlagen werden, die es ohne große Fehlerquellen ermöglicht, die Rolle der Leber beim Abbau bzw. bei der Eliminierung von Arzneimitteln festzustellen.

Am Nachmittag vor dem Versuch führen wir bei Ratten eine partielle Hepatektomie durch, bei der ca. 70% des Organs entfernt werden. Bei einer entsprechenden Anzahl von Kontrolltieren entfernen wir die Milz. Einige Stunden nach dem Eingriff sind die Tiere munter und beginnen meist zu fressen.

Mit Hilfe dieser Methode haben wir die Toxizität (LD 50) einer Reihe von Arzneimitteln an Gruppen von 10—20 hepatektomierten und Kontrollratten pro Dosis untersucht.

Barbitalnatrium und Butabarbitol waren bei hepatektomierten Ratten gleich toxisch wie bei den Kontrolltieren. Überraschend war, daß bei Hexobarbitol und bei Thialbarbiton ebenfalls keine Unterschiede der Toxizität nachweisbar waren. Deutliche und zum Teil sehr große Differenzen ergaben sich bei Urethan und bei Phenobarbitol, ebenso auch für deren Narkosedauer. Ebenso groß war der Toxizitätsunterschied bei Chloralose, Pentobarbitol, Pentothal, geringer bei Cyclobarbitol und bei Amobarbitol.

Erhöhte Toxizität fand sich ferner bei Chlorpromazin, Coffein, Theophyllin und Insulin; sie fehlte bei Codein, Dolantin, Perparin, Pentetetrazol und Nikethamid.

Wir glauben auf Grund der bisherigen Ergebnisse, daß die systematische Anwendung der partiellen Hepatektomie weitgehende Einblicke in den chemischen Abbau von Arzneimitteln in der Leber geben kann. Die mitgeteilten Ergebnisse ermöglichen die praktische Schlußfolgerung, daß Arzneimittel, deren Toxizität bei hepatektomierten Tieren erheblich erhöht ist, bei lebergeschädigten Kranken vermieden werden sollten.