Symposium: Biologisch aktive Polypeptide

H. KONZETT (Innsbruck) : Einleitung

Das Interesse an biologisch aktiven Polypeptiden vereint heute die Physiologischen Chemiker, Biochemiker und Pharmakologen bei diesem Symposium. Polypeptide spielen eine Rolle als Stoffe mit klassischem Hormoncharakter sowie als lokale oder Gewebs-Hormone mit Wirkung in unmittelbarer Nähe des Entstehungsortes. In den letzten Jahren ist die Reindarstellung und die Strukturaufklärung von Polypeptid-Wirkstoffen der beiden Typen gelungen. Ich erwähne in diesem Zusammenhang die Hypophysenhinterlappen-Hormone, das ACTH, das Insulin, das Glucagon, die Melanocyten-stimulierenden-Hormone, das Angiotensin, das Bradykinin, das Kallidin, das Eledoisin. Einzelne dieser Wirkstoffe wurden durch die Synthese auch künstlich hergestellt. Ich erinnere an Oxytocin und an die Vasopressine, an α -MSH, an Angiotensin, Bradykinin, Kallidin und Eledoisin. Bei diesen Körpern handelt es sich um verhältnismäßig kurze, 8–13 Glieder umfassende Peptidketten. Die längste bisher synthetisierte Peptidkette eines biologisch aktiven Stoffes betrifft die Aminosäuresequenz von 1–24 des β -Corticotropins. Diese bewundernswerte und vielleicht auch praktisch bedeutungsvolle Synthese ist im letzten Jahr KAPPELER und SCHWYZER in Basel gelungen.

Die Erfolge der analytischen und der synthetischen Biochemie geben den Biologen viele neue Fragen auf. Da interessieren die Speciesunterschiede im Aufbau der Polypeptidhormone vom Standpunkt einer vergleichenden Entwicklungsgeschichte und Physiologie, das Wirkungsbild der reinen Stoffe ohne Beimengungen, der Aufbau, die Freisetzung und der Abbau im Organismus. Die Rolle mancher dieser hochwirksamen Körper, wie z.B. von Angiotensin und Bradykinin bei physiologischen und pathophysiologischen Vorgängen ist noch nicht sicher geklärt. Im Fall der Substanz P geht es z.B. darum, ob die zentralen Wirkungen der Extrakte tatsächlich der Reinsubstanz zugeschrieben werden können.

Durch die Abwandlung des Moleküls ist es gelungen, eine Reihe von Analogen der Hypophysenhinterlappen-Hormone, des Angiotensins und des Bradykinins herzustellen. Diese Analogen sind meistens schwächer wirksam als die Naturstoffe. So erhebt sich die Frage, ob der Organismus bei gewissen Fehlleistungen in der Synthese nicht etwa falsche Aminosäuren zum Aufbau benützen und dann z.B. Polypeptid-Hormone synthetisieren könnte, die eine falsche Chiffre an den Receptor bringen. Damit taucht die Frage nach den Wirkstoff-Receptor-Beziehungen auf.

Vielleicht wird auf die eine oder andere Frage heute eine Antwort gegeben.