N. RIETBROCK (Hamburg): Bindungsmöglichkeiten des Formaldehyds im Urin

Nach Seefischfütterung erscheint im Urin von Katzen und Hunden Formaldehyd. Durch saure Hydrolyse des ammoniakalischen 24 Std.-Urins werden weitere Mengen an Formaldehyd frei. Neben diesem reversibel, gebundenen Formaldehyd wird ein weiterer Teil irreversibel gebunden. — Formaldehydbestimmung nach Wasserdampfdestillation mit Chromotropsäure.

Wie unsere Untersuchungen ergaben, sind für die Bindung des Formaldehyds im Urin folgende Reaktionen von Bedeutung:

1. Reaktionen zwischen Formaldehyd und Amino- bzw. Imino-
gruppen;
2. Reaktionen zwischen Formaldehyd und Sulfhydrylgruppen;
3. Reaktionen zwischen Formaldehyd und Phenolen.

Formaldehyd wird bei normalen Urin-pH-Werten vornehmlich an Harnstoff gebunden. Die Stabilität der Formaldehyd-Harnstoffbindung im Urin ist abhängig von der H-Ionenkonzentration sowie den Mengenverhältnissen der Reaktionspartner. Da die Harnstoffkonzentration bei den einzelnen Species in weiten Grenzen schwankt, kommt es in einem pH-Bereich von 5—2 entweder zu einem Abfall oder einem Anstieg der Hydrolysekurven.

Aliphatische α -Aminosäuren ohne Heteroatom, basische Aminosäuren, Ammoniak, Methyl- und Dimethylamin im Urin reagieren mit Formaldehyd zu leicht hydrolysierbaren Verbindungen.

Die Bindungen des Formaldehyds an Sulfhydrylgruppen, z.B. schwefelhaltiger Aminosäuren wie Cystein, Methionin usw., sind mit Mineralsäuren nur in stark saurem Milieu und nur teilweise dissoziierbar.

Eine zu starke Ansäuerung des Urins führt jedoch zur Bindung des Formaldehyds an Phenole. Die Farbreaktion zwischen Formaldehyd und 1,8-Dioxynaphthalin-3,6-disulfosäure mit einem spezifischen Absorptionsmaximum bei 578 m μ verschwindet; gleichzeitig tritt ein breites Absorptionsmaximum bei 500 m μ auf.

Dr. N. RIETBROCK, Pharmakologisches Institut der Universität,
2 Hamburg 20, Martinistr. 52

F. KEMPER (Münster): Thalidomid-Studien

Schon bei den ersten Versuchen mit Thalidomid an Hühnern war aufgefallen, daß junge heranwachsende Hähnchen und Hühnchen nach täglicher, oraler Aufnahme von 250 mg/kg Thalidomid innerhalb der vierwöchigen Versuchszeit anämisch wurden, daß ihr Wachstum und ihre sexuelle Entwicklung gehemmt waren, daß die Keimdrüsen infantil