durchaus überlegen. Die wichtigsten Ergebnisse der biochemischen, pharmakologisch-toxikologischen und klinischen Untersuchung werden zusammenfassend dargestellt.

Prof. Dr. med. WOLF DIETER ERDMANN,
Pharmakologisches Institut der Universität, 34 Göttingen, Geiststraße 9

D. HENSCHLER (Würzburg): Die Diffusionskapazität der Lunge als Maß der Wirkung geringer Reizgaskonzentrationen

Für die Beurteilung der Wirkung von Reizgaskonzentrationen in Bereichen, die sich den als unbedenklich anzusehenden Grenzwerten nähern, stehen noch keine befriedigenden Methoden zur Verfügung. Es wird daher der Versuch unternommen, Beeinträchtigungen der Lungenfunktion durch niedrige Konzentrationen von Stickstoffdioxid mit Hilfe der Messung der Diffusionskapazität für Kohlenoxyd zu erfassen.

In einem geschlossenen System, das eine Ratte oder fünf Mäuse aufnehmen kann, werden 200 ppm CO vorgelegt; CO₂ und Wasserdampf werden bei raschem Umlauf über eine Membranpumpe in Patronen komplett absorbiert, der verbrauchte Sauerstoff strömt aus einem Spirometer gemessen nach. Die CO-Konzentration wird im Infrarotanalysator registrierend gemessen, die Abatmungsgeschwindigkeit gilt als Maß der Diffusionskapazität. Die Prüfung, die am wachen, völlig ungezwungenen Tier vorgenommen wird, dauert 15 min und kann beliebig oft wiederholt werden. Ausgewertet wird die in zeitlicher Folge ermittelte Abweichung der Abatmungsgeschwindigkeit vom Durchschnitt der vor der Reizgaseinwirkung gewonnenen Werte.

Zur Überprüfung der Gültigkeit der Haberschen Regel von der Konstanz des Wirkungsproduktes ($C \times T = W$) werden Mäuse Konzentrationen (C) von 150–40 ppm NO₂ über wechselnde Zeiträume (T) exponiert. Nur im Bereiche sehr hoher NO₂-Konzentrationen und kurzer Expositionszeiten gehorcht die Änderung der Diffusionskapazität der Haberschen Formel. Mit zunehmendem Zeitfaktor wird die Wirkung geringer bzw. das zur Erzielung eines bestimmten Effektes erforderliche $C \times T$ -Produkt größer. Bei wochenlangender Einwirkung von 40 ppm NO₂ — das ist ein Viertel der Konzentration, die bei 1 stündiger Einatmung 60% der eingesetzten Ratten tötet — ist die Diffusionskapazität nur während der ersten 3–5 Tage vermindert; als Folge der Ausbildung eines Schutzes gegen die Reizgaswirkung selbst kehren die Werte dann zur Norm zurück. Es ist daher nicht statthaft, von Wirkungsprodukten, die bei kurzer Exposition in hohen Konzentrationen gewonnen worden sind, auf Langzeitwirkungen geringer Konzentrationen umzurechnen.

Doz. Dr. D. HENSCHLER, Institut für Pharmakologie und Toxikologie,
87 Würzburg, Koellikerstraße 2