- HOCKWIN, O., W. LICHT u. E. NOLL: Veränderungen verschiedener Fermentaktivitäten in Linsen von Meerschweinchen mit zunehmendem Lebensalter. Albrecht v. Graefes Arch. Ophthal. **167**, 158—168 (1964).
- HOLT, C. v., U. LEITH, I. HALLMANN, L. v. HOLT u. J. VOELKER: Die Oxydation von 1-¹⁴C-Glucose und 6-¹⁴C-Glucose in Cornea, Linse und Retina. Biochem. Z. **331**, 239—244 (1959).
- KINOSHITA, J. H.: Carbohydrate metabolism of lens. Arch. Ophthal. **54**, 360—368 (1955).
- Pathways of glucose metabolism in the lens. Invest. Ophthal. **4**, 619—628 (1965).
- S. FUTTERMANN, K. SATOL, and L. O. MEROLA: Factors affecting the formation of sugar alcohols in ocular lens. Biochim. biophys. Acta (Amst.) **74**, 340—350 (1963).
- , and C. WACHTL: A study of the ¹⁴C-glucose metabolism of the rabbit lens. J. biol. Chem. **233**, 5—7 (1958).
- LERMAN, S.: Pathogenetic factors in experimental galactose cataract I. Arch. Ophthal. **63**, 128—131 (1960).
- The lens in human and experimental galactosemia. N.Y. St. J. Med. **62**, 785—803 (1962).
- , and B. K. ISHIDA: Pathogenetic factors in experimental galactose cataract II. Arch. Ophthal. **63**, 132—135 (1960).
- LEVARI, R., E. WERTHEIMER, and W. KORNBLUETH: Interrelation between the various pathways of glucose metabolism in the rat lens. Exp. Eye Res. **3**, 99—104 (1964).
- LUH, W., u. H. BRANDAU: Enzymologische Untersuchungen am Corpus luteum graviditatis des Menschen. Z. Geburtsh. Gynäk. **162**, 294—303 (1964).
- PETTE, D.: Plan und Muster im zellulären Stoffwechsel. Naturwissenschaften **52**, 597—616 (1965).
- SCHMIDT, E., u. F. W. SCHMIDT: Enzym-Muster menschlicher Gewebe. Klin. Wschr. **38**, 957—962 (1960).
- WINEGRAD, A. I., and A. E. RENOLD: Studies on rat adipose tissue in vitro. J. biol. Chem. **233**, 273—276 (1958).
- YUGE, T.: Aerobic breakdown of injured calf lens. Jap. J. Ophthal. **7**, 216—219 (1963).

Dr. DIETER FRIEDBURG
Universitäts-Augenklinik
4000 Düsseldorf, Moorenstr. 5

Berichtigung

Über die funktionelle Bedeutung der Lipide in der Cornea

A. DENDEN und O. W. THIELE

Albrecht v. Graefes Arch. klin. exp. Ophthal. **173**, 339—350 (1967)

S. 340, 1. Absatz; der 2. Satz muß heißen:

Solche Unterschiede betreffen vor allem die Plasmalogene; im Monat Mai betrug der Plasmalogengehalt der Gesamtcornea 7,41, im Februar-März 15,04% des Frischgewichtes (ber. als Plasmalogen vom Molekulargewicht 750; vgl. THIELE, 1964).