ture, combine the extracts and dilute to the mark with the same mixture. Prepare a reagent blank in the same way. Measure the absorbance in 10 mm cells against the blank at 360 nm. A calibration graph is obtained by means of standard phosphorus solutions prepared from KH_2PO_4 .

New lubricating oils with $> 0.1\%$ of P should be appropriately diluted with P-free benzene or any other suitable solvent.

The use of Pt-crucibles for the fusion reduces the time required. The effect on the platinum is negligible.

The procedure has been applied to various samples of motor gasolines and also to oils containing Ca, Zn, Ba and S besides of P. Satisfactory results have been obtained in all cases.

References

1. Boltz, D. F., Mellon, M. G.: *Anal. Chem.* **20**, 749 (1948).
2. Farrer, K. T. H., Muir, S. J.: *Australian Chem. Inst. J. Proc.* **11**, 222 (1944).
3. Gedansky, S. J., Bowen, J. E., Milner, O. I.: *Anal. Chem.* **33**, 968 (1961); cf. *Z. Anal. Chem.* **188**, 300 (1962).
4. Lueck, C. H., Boltz, D. F.: *Anal. Chem.* **28**, 1168 (1956); cf. *Z. Anal. Chem.* **155**, 370 (1957).
5. Marvel, R. V.: *Zavodsk. Lab.* **11**, 135 (1945).

Mr. B. B. Agrawal
Indian Institute of Petroleum
Dehra Dun, U. P. (India)

Acidimetrische Bestimmung von Chlordiazepoxid (Librium) in wäßriger Lösung

Acidimetric Determination of Chlordiazepoxide (Librium) in Aqueous Medium

K. REHSE

Pharmazeutisches Institut der Freien Universität Berlin

Eingegangen am 24. Februar 1971

Chlordiazepoxid wird üblicherweise durch Titration mit Perchlorsäure in wasserfreiem Milieu bestimmt [1–3]. Die Anwesenheit einer Amidinstruktur im Molekül (I) läßt jedoch vermuten, daß auch eine

Bestimmung in wäßriger Lösung möglich sein müßte, da Amidine basischer als Amide und oft auch basischer als Amine sind.

Löst man I in 0,1 N Salzsäure, so erhält man unter Protonierung II [4], d. h. die zum Amidin korrespondierende Säure, die infolge der starken Basizität des Amidins entsprechend schwach ist. Die überschüssige Salzsäure läßt sich neben der schwachen Säure II mit Natronlauge quantitativ erfassen, wenn man einen Indicator wählt, dessen Umschlagsbereich im sauren Gebiet liegt. Geeignet ist z. B. Bromphenolblau mit einem Umschlagsintervall von 3,0–4,6, während Methylrot (4,2–6,3) schon nicht mehr benutzt werden kann.

Vorschrift. Das zu prüfende Chlordiazepoxid (50–200 mg) wird genau eingewogen und in 10 ml 0,1 N Salzsäure gelöst. Nach Zugabe von 2 Tr. Bromphenolblaulösung (DAB 7) wird mit 0,1 N Natronlauge auf den Umschlag nach Grünblau titriert. 1 ml nicht zurücktitrierter 0,1 N Salzsäure entspricht 29,98 mg Chlordiazepoxid. Die Genauigkeit wird durch Farbvergleich mit einer austitrierten Lösung erhöht und ist dann besser als 2% relativ.

Literatur

1. Beral, H., Calafeteanu, I., Dumitrescu, E., Grintescu, P.: *Rev. Chim. (Bukarest)* **16**, 169 (1965); vgl. diese Z. **230**, 394 (1967).
2. Beyer, K.-H., Sadée, W.: *Deut. Apotheker-Ztg.* **109**, 312 (1969).
3. Marques Leal, A., Manuela Leite Inacio, M.: *Rev. Port. Farm.* **12**, 338–343 (1962).
4. Möhrle, H., Schittenhelm, D., Gundlach, P.: *Arch. Pharmaz. (in Vorbereitung)*.

Prof. Dr. K. Rehse
Pharmazeutisches Institut der Freien Universität Berlin
D-1000 Berlin 33, Königin Luise-Str. 2–4
Deutschland