Eine schnelle Methode zur Bestimmung des Verhältnisses der Gehalte an p,p'-DDT und p,p'-DDE in Fisch. D. L. Fort. Das vorliegende dünn-schicht-chromatographische Verfahren wird als eine einfache Routinemethode empfohlen. — *Arbeitsweise.* Die Fischproben von 0,05–0,1 g werden mit 2–4 ml Ameisensäure 1,5–2 h bei 60°C behandelt und anschließend 4 mal mit Hexan extrahiert. Die vereinigten Extrakte werden zur Trockne eingedampft und der Rückstand 3 mal jeweils mit 2 ml Acetonitril ausgewaschen. Dann fügt man 20 mg Aluminiumoxid (80–200 mesh) hinzu und zentrifugiert. Nach Eindampfen der flüssigen Schicht wird der trockne Rückstand in wenig Äthylacetat aufgenommen und auf eine mit Aluminiumoxid beschichtete Platte aufgetragen. Man chromatographiert nach M. F. KOVACS [J. Assoc. Offic. Agr. Chemists 46, 884 (1963); vgl. diese Z. 206, 63 (1964)], als Fließmittel dient Heptan oder Petroläther (Kp 30–60°C), wobei das letzte eine bessere Auftrennung beider Substanzen ermöglicht. Verf. arbeitet mit ¹⁴C-markiertem DDT und ermittelt auf den Chromatogrammen durch Aktivitätsmessung DDT sowie die entsprechenden Abbauprodukte, DDE und DDD. Die Ergebnisse sind etwas niedriger als die nach der bisher verwendeten Methode [Mills P. A., J. H. Onley and R. A. Gaither: J. Assoc. Offic. Agr. Chemists 46, 186 (1963); vgl. diese Z. 203, 67 (1964)].

J. Chromatog. 34, 120–121 (1968). Southeast Water Lab., Athens, Ga. 3069 (USA). J. Hanuš

Bestimmung von 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure und ihren Butoxyäthanolestern in Austern mit Hilfe der Gas-Chromatographie. J. R. Duffy und P. Shelfoon. 2,4-D-Ester werden als Herbizide in der Austernkultur angewandt. — Die Austern werden zusammen mit wasserfreiem Natriumsulfat homogenisiert und mit Acetonitril extrahiert. Der Extrakt wird mit äthanolischer Kalilauge hydrolysiert, angesäuert und mit Äthyläther/Petroläther (1:1) extrahiert. Die organische Phase wird mit 0,5 M Natriumcarbonatlösung extrahiert und die wäßrige Phase nach Ansäuern erneut mit Äthyläther/Petroläther extrahiert. Nach Verdampfen des Lösungsmittels wird mit Diazomethan verestert und der Ester durch Chromatographie über eine Florisilsäule mit 10% Äthylacetat in Petroläther eluiert. Der hierin enthaltene 2,4-D-Methylester wird quantitativ durch Elektroneneinfang-Gas-Chromatographie (Säule 1,35 m × 0,6 cm mit 10% DC 200 + 15% QF-1 auf Chromosorb W, 80–90 mesh; 170°C) bestimmt. Seine Identität wird durch Dünnschicht-Chromatographie auf Silicagel mit Hexan/Chloroform (4:3) geprüft. Die genaue Arbeitsvorschrift wird im Original mitgeteilt.

J. Assoc. Offic. Anal. Chemists 50, 1098–1102 (1967). St. Dunstan's Univ., Dept. Chem., Charlottetown, Prince Edward Island (Canada). A. Niemann

Bestimmung von Niagara NIA-10242 und seinem phenolischen Abbauprodukt in Maissilage und Milch, und Bestimmung von anderen Carbamaten durch Gas-Chromatographie ihrer Thiophosphorylderivate. M. C. Bowman und M. Beroza. — *Prinzip des Verfahrens.* Die Proben werden mit Aceton gemischt und filtriert. Das Filtrat wird mit Methylenechlorid extrahiert, der eingedampfte Rückstand mit Chloro-

form perkoliert und diese Lösung auf eine Aluminiumoxidsäule gegeben. Chloroform eluiert NIA-10242. Dann wird mit Methanol NIA-10272 eluiert. Beide Verbindungen werden durch alkalische Hydrolyse zu den entsprechenden Phenolen abgebaut. Diese werden durch Wasserdampfdestillation isoliert und dann in Gegenwart von Pyridin mit Dimethylchlorthiophosphat zum entsprechenden Ester umgesetzt. Diese werden über eine 120 cm lange Säule mit 10% DC 200 auf 80–100 mesh Gas-Chrom Q mit dem Melpar-Flammenphotometer-Detektor gas-chromatographisch bestimmt.

J. Assoc. Offic. Anal. Chemists 50, 926–933 (1967). Entomol. Res. Div., Agricult. Res. Serv., U.S. Dept. Agricult. Tifton, Ga., und Beltsville, Md. (USA). A. Niemann

Berichtigung

Polarographische Bestimmung von Vitamin E

1. Bestimmung der Gesamttocopherole

K. WISSER, W. HEIMANN und CH. FRITSCHÉ

Institut für Lebensmittelchemie der Universität Karlsruhe

Diese Z. 230, 189 (1967)

In der oben genannten Arbeit findet sich S. 190, 3. Absatz die Feststellung, daß der Tocopherol-Bestimmungsmethode von Niederstebruch u. Hinsch [1] ein prinzipieller Fehler bei der Bestimmung der von vornherein oxydiert vorliegenden Tocopherole anhafte.

Unveröffentlichte Untersuchungen von Hinsch u. Rost (Unilever-Forschungslabor Hamburg) ergaben, daß dieser Fehler *nicht* existiert.

Weitere Untersuchungen beider Seiten brachten die Klärung, daß die beschriebene Depression der polarographischen Stufen von Chinonen in Alkohol nicht durch den Cer-, sondern durch den Wassergehalt der Oxydationslösung entsteht. Bei beiden Methoden ist zwar der Wasseranteil der zu polarographierenden Lösungen verschieden, innerhalb der jeweiligen Methode jedoch durchweg gleich.

Somit ist die Methode von Niederstebruch u. Hinsch fehlerfrei. Der oben genannte Absatz unserer Publikation ist zu streichen.

Für die Mühe um die Klärung dieser Frage danken wir Herrn Rost und Frl. Hinsch.

1. Niederstebruch, A., u. I. Hinsch: Fette, Seifen, Anstrichmittel 67, 884 (1965); 69, 559 (1967). K. Wisser