von Zephiron, einem Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid, kann EVANS Blau in Lösung gehalten werden. Die Messung der Lichtabsorption kann dann bei 620 $m\mu$ erfolgen. Verwendet wurde dazu ein Beckman DU-Quarzspektrophotometer mit normaler oder Mikrozelle. Der Fehler wird beim Arbeiten mit Zephiron kleiner als 1%.

G. DENK.

Zur Charakterisierung der Carcinogenität hoch siedender Petroleumprodukte schlagen L. T. EBY, W. PRIESTLEY jr., J. REHNER jr. und M. E. HALL¹ eine nicht biologische Laboratoriumsmethode vor, die sich darauf gründet, daß nur die aromatischen polycyclischen Verbindungen für die Carcinomentstehung maßgebend sind. Es werden 5 physikalische Verfahren vorgeschlagen, die in ihrer Beziehung zueinander einen sicheren Anhalt dafür bieten sollen, wie groß die tumorerzeugende Kraft der Fraktion ist. Es handelt sich 1. um die *Messung der UV-Absorption bei 360 $m\mu$ für Fraktionen*, die bei 5 mm Hg zwischen 177 und 331° C sieden. Dabei wird durch Viskositätsmessung ein Korrekturfaktor aufgestellt, da einige sehr viscose Proben eine beträchtliche UV-Absorption zeigen, ohne jedoch biologisch aktiv zu sein. Weiterhin wird 2. nach einer *einfachen UV-Methode die Extinktion bei 344, 364 und 470 $m\mu$ gemessen*. Charakteristisch ist ferner 3. die sogenannte *Coffeinzahl*, deren Ausführung früher² beschrieben wurde. Sie besteht in der Messung der Differenz der Absorption bei 340 und 460 $m\mu$ in bezug auf eine 0,1 m Coffeinelösung. 4. wird die *Charakterisierung der hocharomatischen Stoffe* durch chromatographische Trennung³ auf einer Silicagelsäule und Elution mit n Heptan, Benzol und Pyridin vorgenommen. In Benzol sind die aromatischen, in Pyridin die oxyaromatischen Stoffe löslich; außerdem wird der Brechungsindex der aromatischen Fraktion bei 20° C gemessen. Schließlich wird 5. der *polarographische Diffusionsstrom* zwischen — 1,2 und — 2,0 V an einer tropfenden Quecksilberkathode in 0,1 m Tetra-n-butylammoniumjodidlösung gemessen. Als Lösungsmittel dient Methanol-Benzol (1:1). Auch hier wird mittels Viskositätsmessung eine entsprechende Korrektur vorgenommen. — Durch eine große Zahl von Untersuchungen, die durch Tabellen belegt werden, schließen die Autoren, daß die physikalische Methode ebenso sicher wie die biologische ist.

K. HINSBERG.

Über die Verteilungs-Papierchromatographie von Hormonen der Steroidreihe beschreiben M. FUJISAKI, Y. ARAI, T. KON und M. ITOH⁴ eine Modifikation der Methode von ZAFFARONI u. Mitarb.⁵ Nach Angabe der Verff. hat die Art der Vorbehandlung des Filterpapiers mit Propylenglykol-Methanol einen Einfluß auf die Reproduzierbarkeit der R_f -Werte. Diese verändern sich mit der Menge des im Papier verbliebenen Propylenglykols. Ferner macht die Erkennung der Toluolfrent bei stark mit Propylenglykol getränktem Papier Schwierigkeiten. Bei Einhaltung genauer Versuchsbedingungen erhalten Verff. konstante R_f -Werte. — *Arbeitsweise*. Das Papier wird kurz in Propylenglykol-Methanol (1:1) gelegt, dann zwischen anderen Filterpapieren ausgepreßt, dies mit neuem Filterpapier einmal wiederholt und das getränkte Papier dann bei $26 \pm 3^\circ \text{C}$ 60 min an der Luft angetrocknet. Die Entwicklung des Chromatogramms mit Toluol erfolgt ebenfalls bei $26 \pm 3^\circ \text{C}$ nach der aufsteigenden Methode. Getrocknet wird daraufhin bei 100–120° C.

¹ Analyt. Chemistry **25**, 1500–1507 (1953). Stand. Oil. Develop. Co., Linden, N. J. und Humble Oil Refining Co., Baytown, Tex. (USA).

² WANLESS, G. G., L. T. EBY and J. REHNER jr.: Analyt. Chemistry **23**, 563 (1951).

³ EBY, L. T.: Analyt. Chemistry **25**, 1057 (1953).

⁴ Folia endocrinol. japon. **29**, 148–151 (1953). Sanzen Pharmac. Comp. und Univ. Tokyo (Japan).

⁵ ZAFFARONI, A., R. B. BURTON and E. H. KEUTMANN: J. biol. Chemistry **193**, 749 (1951).