Streifen (je 5 min lang) mit Wasser. Der Streifen wird sodann 15 min in eine 0,01 m Lösung von NaJ, die 4 μ C/ml ^{131}J enthält eingetaucht. Der Streifen wird dreimal je 5 min in Wasser gewaschen und bei Raumtemperatur über Nacht im Dunkeln getrocknet. Linol- und Ölsäure geben keine unlöslichen Ag-Seifen.

¹ Nukleonika (Warszawa), Spec. Nr., **3**, 133—144 (1958). Akad. Wiss. Warschau (Polen). — ² Fette u. Seifen **53**, 253 (1951); vgl. diese Z. **135**, 285 (1952). L. ACKER

Zur Bestimmung von Methacrylsäureestern kann man nach K. L. MALLIK und M. N. DAS¹ die Umsetzung mit Quecksilberacetat anwenden, wenn man die langsame Reaktion dieser Äthylenderivate durch Hinzufügen von Salpetersäure oder besser Perchlorsäure katalytisch beschleunigt. — *Arbeitsweise.* Man läßt auf 5 ml etwa 0,1 m Esterlösung in Methanol 10 ml Quecksilberacetatreagens (0,1 m Hg^{II} -Acetat + 0,01 m Perchlorsäure in Methanol, stabilisiert mit etwas Eisessig) bei 45°C 30 min einwirken, fügt 0,2% ige Thymolblau-Indicatorlösung in Methanol und tropfenweise gesättigte Natriumchloridlösung in Äthylenglykol bis zum Umschlag nach Gelb hinzu und titriert mit 0,1 n Salzsäure in Butanol auf einen rosa Farbton. Daneben setzt man eine Bestimmung ohne Ester an. Die Differenz beider Titrationen entspricht dem Estergehalt.

¹ Chem. and Ind. **1959**, 162. Jadavpur-Univ., Calcutta (Indien). F. NEUMANN

Phenole. Ein neues Nachweisreagens auf Phenole für die Papierchromatographie, welches charakterische Färbungen von guter Beständigkeit liefert, beschreibt F. KLINKHAMMER¹. Das getrocknete Chromatogramm wird mit wäßriger Ammoniumvanadatlösung² besprüht, wobei sich schwach gelbe bis ockerfarbene Flecken ausbilden, die von der gelblichen Ammoniumvanadatlösung zum Teil überdeckt werden. Anschließend besprüht man die noch feuchten Papierchromatogramme mit einer alkoholischen, phosphorsauren p-Anisidinlösung (0,5 g p-Anisidin werden in 2 ml Phosphorsäure gelöst, mit abs. Alkohol auf 100 ml aufgefüllt und vom ausgefallenen Phosphat abfiltriert). Gleich nach diesem zweiten Besprühen erscheinen die orangefarbenen Flecken auf einem tiefroten Hintergrund. Beim Trocknen der Chromatogramme verblaßt der rote Anisidin-Vanadatkomplex, und die Flecke erscheinen in der für sie charakteristischen Farbe auf einem schwach rosa Hintergrund. Das Zerstören der roten Farbkomplexe wird durch Trocknen im Trockenschrank bei 80°C beschleunigt. Bisher wurden nach der angegebenen Methode in Pflanzenextrakten nachgewiesen: *Quercetin* (gelb), *Quercitrin* (braun), *Kaffeesäure* (rot), *Chlorogensäure* (rosa), *Ferulasäure* (graugrün), *D-Catechin* (graubraun) und *Phloroglucin* (blaugrün). Über die Anwendung des Nachweises zur Identifizierung weiterer phenolischer Substanzen soll noch berichtet werden.

¹ Naturwissenschaften **45**, 571 (1958). Fa. Schaper & Brümmer, Salzgitter-Ringelheim. — ² CRAMER, F.: Papierchromatographie. Verlag Chemie 1958.

H. GARSCHAGEN

D. B. BRUSS und G. A. HARLOW¹ untersuchen die *konduktometrischen Titrationskurven von Phenolen in nichtwäßrigen Lösungen (Benzol, Xylol, Toluol, Tetrachlorkohlenstoff, Pyridin, Aceton, und Methylisobutylketon)* mit Hilfe von Wechselstrom- und Gleichstrommethoden. *Phenole ohne sterische Hinderung* zeigen bei ihren Leitfähigkeitskurven Kurvenmittelpunktsmaxima, die durch die Bildung von Ionenpaaren zwischen dem Titrationsmittel-Kation und einem Säure-Anionkomplex (Wasserstoffbrücke) erklärt werden. Für die konduktometrischen Titrationen in Lösungsmitteln mittlerer DK benutzen Verff. eine Leeds & Northrup Leitfähigkeitsbrücke Modell 4866 bei 60 Hz. Bei inerten Lösungsmitteln wird eine Gleichstromanordnung angewendet, bei der eine Spannung von 1,5 V an die Zelle gelegt wird.