Lösungsmitteln. Dazu werden 2 ml Öl mit einer 25 ml-Meßpipette angesaugt und die Pipette unten mit einem Stopfen verschlossen. Von oben werden 18 ml Lösungsmittel zugegeben und dann kräftig geschüttelt. Zum Absetzen der unlöslichen Anteile läßt man 5 Std stehen. Am besten geeignet erweist sich Propanol gegenüber Aceton und Butanol. Wasser muß auch in Spuren vermieden werden. Durch Propanol werden die Monomeren von den Polymeren abgetrennt. Harnstoffadduktfällungen der Fettsäuren aus polymerisiertem Leinöl erweisen sich als zur Charakterisierung ungeeignet. Über 10% polymere Glyceride lassen sich papierchromatographisch gut nachweisen, wenn die in ätherischer Lösung aufgetragenen Produkte mit Methanol-Aceton (1:1) entwickelt werden. Dabei wird das nicht polymerisierte Öl ausgewaschen, während das Polymerisat am Startpunkt bleibt. Zur Sichtbarmachung dient eine wäßrige Rhodamin B-Nilblausulfatlösung. Ein eindeutiger Nachweis ist durch Molekulardestillation möglich, aber diese ist für die Praxis wegen der apparativen Voraussetzungen schwer realisierbar.

¹ Dtsch. Lebensmittel-Rdsch. **54**, 245–252 (1958). Inst. Lebensmittelchemie u. -technol., Humboldt-Univ. Berlin. B. ROSSMANN

Über die Papierchromatographie von Sterinen aus Tier- und Pflanzenfetten berichten J. C. RIEMERSMA und W. STOUTJESDIJK¹. Zur Prüfung von Lebensmittel-fetten auf ihren Gehalt an tierischen bzw. pflanzlichen Bestandteilen wird ihr Gehalt an *Cholesterin* (I) bzw. *Sitosterin* (II) oder *Stigmasterin* (III) bestimmt. Um die interessierenden Sterine getrennt erfassen zu können, werden sie papierchromatographiert. Von mehreren verschiedenen Verfahren geben die Verf. dem von H. SULSER und O. HÖGL² den Vorzug. Man verseift das Fett, fällt die Sterine mit Digitonin, acetyliert mit Essigsäureanhydrid und bromiert die Acetate zu den Acetatbromiden. Diese chromatographiert man aufsteigend oder absteigend auf Whatman-Papier Nr. 1 oder 2, das mit Paraffinum liquidum getränkt ist. Als mobile Phase dient 80%ige Essigsäure oder 96%iges Äthanol. Das Acetatbromid von I hat den größten R_F-Wert, das von II wandert nicht ganz so weit, III-Acetatbromid bleibt am Start. Zur Lokalisierung der Flecken dient Phosphormolybdänsäurereagens.

¹ Mitt.-Gebiete Lebensmittelunters. Hyg. (Bern) **49**, 115–120 (1958). Reichsunters.-Anst. Molkereiprodukte u. Nahrungsfette, Leiden (Holland). — ² Mitt.-Gebiete Lebensmittelunters. Hyg. (Bern) **48**, 248 (1957). H. PELZER

Zur Bestimmung des Wasserbindungsvermögens von Fleisch haben E. GRÖSCHNER, O. HAMANN und M. SCHARNBECK¹ die Preßdruckverfahren von R. GRAU und R. HAMM² und von F. NIINIVAARA und M. POHJA³ weiterentwickelt und eine besondere Apparatur konstruiert, welche die Messung von 8 Proben gleichzeitig erlaubt. An Stelle von Brät verwenden sie dünne Fleischscheibchen. Die Apparatur sowie die Arbeitsweise werden im einzelnen beschrieben. Die neue Methode bringt einen erheblichen Zeitgewinn.

¹ Nahrung **2**, 669–682 (1958). Forsch.-Inst. Kühl- u. Gefrierwirtschaft, Magdeburg. — ² Fleischwirtschaft **8**, 733 (1956). — HAMM, R.: Fleischwirtschaft **6**, 396 (1954). — ³ Fleischwirtschaft **6**, 192 (1954). — POHJA, M., u. F. NIINIVAARA: Fleischwirtschaft **9**, 193 (1957). L. ACKER

Vitamine. Bei der Bestimmung von Thiamin mit 6-Aminothymol in alkalischer Lösung scheint nach K. J. HAYDEN¹ die Sulfhydrylgruppe die für die Farbreaktion maßgebende Gruppe zu sein, wie weitere Untersuchungen an thiolgruppenhaltigen