72. R. Probst (Luzern): Lärmschwerhörigkeit — einige Gedanken zur medizinischen Prophylaxe

Noise Induced Hearing Loss-Some Remarks to Prophylactic Measures

Summary. Industrial noise induced deafness seems to become a social and financial problem, which perhaps generally is underestimated. Medical prophylactic measures have to be taken. The reasons for this prophylaxis are explained from the otological and occupational point of view.

Mobil units are very useful to survey (audiometry, case history) the great number of exposed persons in industry.

The "Audiomobil-Programm" of the Swiss Insurance Institut (also the Insurance of occupational diseases) is shortly presented. Great parts of this programm are highly computerised.

73. D. Leithäuser (Gießen): Möglichkeiten der medikamentösen Behandlung von akuten Schallschäden

Chances of Medical Treatment of Blast Trauma

Summary. The recovery of cochlear damage following blastinjuries and the possible influence of a medical treatment upon it were investigated in all long follow up in 72 Patients. There was a statistical evidence of a better recovery in one group treated over long time with Xanthinolnicotinate compared with another group of patients treated with Vitamins combination.

The succes of treatment was correlated with the degree of damage and the time interval between begin of disease and comencement of therapy.

Es wird über die medikamentöse Beeinflussung des knalltraumatischen Hörschadens bei 72 Patienten berichtet. Eine Gruppe 46 Patienten — Durchschnittsalter 21,5 Jahre — erhielt Xant inolnikotinat (Complamin®) peroral in steigender Dosierung, das Vergleichskollektiv, 26 Patienten, eine Vitaminkombination. Ausgewertet und statistisch nach der Varianzanalyse überprüft wurden die tonaudiometrischen Meßergebnisse 2 Monate nach dem Schalltrauma. Gleichzeitig erfolgte die Bewertung des Ohrgeräusches.

Die Beurteilung der Rückbildung erfolgte zum einen nach dem Schweregrad des Traumas in drei Gruppen.

1. Schmale Senken bis 50 dB;
2. Breite Senken über 50 dB;
3. Schrägabfall der Hörkurve ab C 3/C 4.

Ein Fünftel aller Hörsenken zeigten bei beiden Behandlungsgruppen keinerlei Rückbildungstendenz, ansonsten kann bei der Complamin-behandelten Gruppe eine deutlich bessere Rückbildung der Hörsenken sowie des Ohrgeräusches bei allen Schweregraden des Schallschadens nachgewiesen werden.

Bei einer Einteilung der Gruppen nach dem Zeitraum zwischen Schalltrauma und Behandlungsbeginn kann bei der Complamin-behandelten Gruppe nur in den ersten 2 Wochen nach dem Schalltrauma ein deutlich besserer therapeutischer