99. G. Stange (Freiburg i. Br.): Bindegewebs-Siliconfolien-Plastiken bei Adhäsivprozessen des Mittelohres

Connective Tissue—Silicone Foils—Tymanoplastics in Cases of Adhesive Processes of the Middle Ear

Summary. In 1970—1974, tymanoplastics of type I—III were done in 95 patients with adhesive processes of the middle ear (epithelized tympanon, scarred adhesions of the chain, sclerosis of the tympanon etc.) following chronic inflammation or cholesteatoma. In order to avoid renewal of adhesions, to make possible the growth of mucosa and to obtain pneumatization of the middle ear, 1—3 pieces of silicone foil were inserted to each patient into the middle ear. In 21 patients the silicone foil was removed. Technique of insertion and problems of removal of the foil as well as audiological postoperative results are demonstrated and discussed. Further details will be published in Arch. Oto-Rhino-Laryng.

Bei 95 Patienten mit Adhäsivprozessen des Mittelohres (Epithelisierte Pauke; narbige Verwachsungen der Kette und des Mittelohres; Tubenstenosen; Paukensklerosen etc.) nach chronischen Entzündungen und nach Cholesteatomen wurden in den Jahren 1970—1974 Tymanoplastiken der Typen I—III durchgeführt. Bei allen Patienten wurde Siliconfolie der operativen Situation entsprechend in das Mittelohr eingelegt, um erneute Verwachsungen zu verhindern, um ein Einwachsen von Schleimhaut zu ermöglichen und um die Belüftung des Mittelohres zu erreichen. Bei 41 Patienten, die die besten postoperativen Hörgewinne hatten, wurden mehrere Stückchen Siliconfolie eingelegt. Bei 21 Patienten wurde die Siliconfolie wieder entfernt. Die Technik des Einlegens und die Problematik des Entfernens der Siliconfolie und die audilogischen, postoperativen Resultate werden dargestellt und diskutiert. Die ausführliche Publikation erfolgt in Arch. Oto-Rhino-Laryng.

100. C. L. Schmidt und G. Mürker (Freiburg i. Br.): Eine quantitative Untersuchung des calorischen und postrotatorischen Nystagmus beim Menschen

Quantitative Analysis of Caloric and Post-Rotatory Nystagmus in Man

Summary. Evaluation of the following parameters of caloric and postrotatory nystagmus (slow phase velocity, number of beats, duration of nystagmus and frequency) showed that besides slow phase velocity, duration of nystagmus and number of beats are the best criteria to be considered in vestibular examination. The range of variety of all these parameters in healthy subjects makes it inappropriate to use computers for automatical nystagmus analysis or standardized evaluation schemes. A progress in vestibular examination could be expected from recording the action potentials of single muscle fibers of the human m. splenius capitis unter vestibular stimulation.

Unter standardisierten Bedingungen wurden junge, anamnestisch unauffällige und zur Zeit der Untersuchung gesunde Versuchspersonen calorisch (Spülung jeden Gehörgangs mit Wasser von 30 und 44° C, 40 sec) und rotatorisch (Stop aus Drehungen mit 30, 60, 90, 120, 150 und 180°/sec²) gereizt. Die Auswertung der so erhaltenen calorischen und postrotatorischen Nystagmen geschah durch Ermittlung der Winkelgeschwindigkeit der langsamen Phasen der Schlagzahl und Schlagdauer, sowie der Frequenz. Es zeigte sich, daß die Winkel-