Fluoreszenz wieder in Erscheinung. Ferner zeigt Fluorexon bei argentometrischen Titrationen auch die Eigenschaften eines Adsorptionsindicators. Die Bestimmung von Chloriden unter Verwendung von Fluorexon ist wegen des relativ hohen Löslichkeitsproduktes von AgCl nicht möglich. — Zur *Bestimmung von Bromiden und Jodiden* wird die zu untersuchende Lösung auf etwa 50 ml verdünnt und mit 0,5 g Borax (p_H etwa 9) und einer kleinen Menge Fluorexon versetzt. Es wird mit einer 0,1—0,01 m Silbernitratlösung unter intensivem Rühren bis zum Verschwinden der Fluoreszenz titriert. Der mittlere Fehler der einzelnen Bestimmung beträgt für 0,8—55,0 mg $Br^- \pm 0,34\%$ bzw. für 0,7—108,0 mg $J^- \pm 0,40\%$. Die Bestimmung von Bromiden und Jodiden neben Chloriden gelingt nicht, da bereits bei kleinen Chloridkonzentrationen große positive Fehler auftreten. — Bei der *Cyanidbestimmung* tritt der Umschlag bereits bei einem Verhältnis Ag:CN (1:1) auf. Die Titration wird bei p_H 9—11 unter Verwendung von Borsäure-Kaliumhydroxid-Puffer (p_H 11) durchgeführt. Bei der Titration mit 0,01 m $AgNO_3$ -Lösung beträgt der mittlere Fehler für 0,26—0,8 mg $CN^- \pm 0,40\%$.

¹ Collect. czechoslov. chem. Commun. **26**, 2449—2452 (1961). Anal. Lab., Inst. Geochemie mineralog. Rohstoffe, Akad. Wiss., Prag (ČSSR). H. ZIMMER

Aluminon I (Ammoniumsalz der Aurintricarbonsäure) verwendet P. C. KINDU¹ als Metallindicator bei der komplexometrischen *Bestimmung von Fe³⁺, Al, Ca und Mg mit ÄDTA*. Fe^{3+} wird bei p_H 1—2 bei Raumtemperatur in einem Aceton-Wasser-Gemisch (1:1) titriert. Farbumschlag von Tiefviolett nach Farblos. — Al wird bei p_H 4,4 (Acetatpuffer) in siedender Lösung bestimmt. Der Indicator wird mit Methylenblau vermischt; Farbumschlag von Blutrot nach Blauviolett. — Ca und Mg werden in schwach alkalischem Medium (Ammoniak) titriert. Farbumschlag von Rotviolett nach Farblos oder Schwachgelb. Bei Mg ist ein Ammoniumchloridzusatz notwendig.

¹ Naturwissenschaften **48**, 644—645 (1961). Chandernagore College, Chandernagore, Westbengalen (Indien). R. HÖNIGSCHMID-GROSSICH

ÄDTA (I) in Lösungen ihrer Metallchelate bestimmt V. V. STAROSTIN¹ indirekt nach Zugabe von 0,01 m $Bi(NO_3)_3$ -Lösung im Überschuß und dessen Retitration mit 0,01 m ÄDTA gegen Brenzcatechinviolett, Xylenorange oder auch Gallein und Hämatoxylin bei p_H 1—1,5. In Lösungen der (I)-Chelate mit zweiwertigen Metallen wird dabei (I) aus dem Chelat mit Bi^{3+} quantitativ verdrängt, innerhalb 20 min in der Kälte, und 1 min in der Siedehitze. Die notwendige Bedingung dafür ist $pK_{Bi-(I)} - pK_{M-(I)} > 3$. Fe^{III} -(I) muß vorher mit Ascorbinsäure oder Natriumdithionit reduziert werden. Cr^{III} -(I) reagiert nicht mit Bi^{3+} . Der Anteil der im Chelat gebundenen (I) wird bei 550 nm und p_H 3,5—4 wie üblich photometrisch bestimmt. S^{2-} Ionen stören.

¹ Ž. anal. Chim. **16**, 620—622 (1961) [Russisch]. (Mit engl. Zus.fass.)

L. SOMMER

Die Farbreaktionen von α -SNADNS-6 (I) und β -SNADNS-6 (II) (3-[6-Sulfo-1-naphthylazo]- bzw. 3-[6-Sulfo-2-naphthylazo]-derivat der 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure oder Chromotropsäure) mit verschiedenen Metallionen hat S. K. DATTA¹ untersucht und dabei festgestellt, daß in den meisten Fällen die Farbreaktion mit dem β -Isomeren intensiver ist. I ist in saurer Lösung rosenrot, in alkalischer karmesinrot, II in saurer Lösung scharlachrot, in alkalischer braunrot. Mit den Ionen Fe^{III} , Th^{IV} , V^{IV} und Zr^{IV} erfolgt der Farbumschlag bei p_H 1,5—4,5, mit Al^{III} , Be^{II} , Ca^{II} , Ce^{III} , La^{III} , Mg^{II} , Mn^{II} , U^{VI} , Y^{III} und Zn^{II} bei p_H 5,0—6,5 und mit Co^{II} , Ni^{II} und Cu^{II} bei p_H 7,8—8,0. Liegt z.B. ein Gemisch aus Th mit einem Metall der Gruppe Co, Ni oder Cu vor, wird eine Tüpfelprobe bei p_H 2,5 und