Symposion IV

Andrologie

Freitag, den 1. Oktober 1965

Leitung: C. SCHIRREN, Hamburg

1. Thema: Sonderformen des Hypogonadismus

C. SCHIRREN, Hamburg: Einführung

Der Hypogonadismus beim Manne wird im allgemeinen in einen primären, hypergonadotropen und einen sekundären, hypogonadotropen Hypogonadismus unterteilt, je nachdem, an welcher Stelle die verantwortliche Schädigung eingesetzt hat. Bei der primären Form ist der Hoden selbst primär betroffen, während bei der sekundären Form der Hoden erst sekundär, primär dagegen ein übergeordnetes Zentrum (z.B. Hypophyse, Nebenniere) geschädigt ist.

Unter *Sonderformen des Hypogonadismus beim Manne* verstehe ich die Formen, die hinsichtlich ihrer klinischen Symptomatik aus dem üblichen Rahmen fallen. Es werden also ausgeschlossen der primär traumatische Hypogonadismus, über den wir in Zürich unter Leitung von Herrn DOEPFNER verhandelt haben, und auch das sogenannte Klinefelter-Syndrom, über das s. Z. in Hamburg unter Herrn NOWAKOWSKI diskutiert wurde. Ebenso scheidet die Oligospermie als primärer Hypogonadismus aus. Wir wollen heute ausschließlich 5 Formen besprechen, die mir von der Thematik her besonders interessant erscheinen. Alle 5 Formen sind selten. Das bedeutet allerdings nicht, daß sie nicht auch bedeutungsvoll sind. Wir müssen ihre Symptomatik und ihre Therapie kennen, um den hilfesuchenden Patienten recht beraten zu können.

Wir haben als Gäste eine Reihe von Fachvertretern anderer Disziplinen unter uns. Ihnen gilt mein besonderer Willkommensgruß. Es erschien mir wichtig, sie zu einzelnen Beiträgen zu bitten, um auf diese Weise aus berufenem Munde die modernsten Ansichten zu den behandelten Fragen zu erhalten. Sie beweisen durch ihre Teilnahme an unserem Symposium, daß die Andrologie in ganz besonderem Maße geeignet ist, zwischen den verschiedenen Disziplinen der Medizin einen Brücken-

schlag zu führen, aus dem eine echte Synopsis werden kann. Mit jedem Referenten ist eine Redezeit von maximal 10 min abgesprochen, damit wir ausreichend Zeit für die Aussprache haben.

C. OVERZIER, Mainz: Das sogenannte männliche Turner-Syndrom

TURNER (1938) beschrieb bei phänotypisch-weiblichen Personen die Trias: Infantilismus, Breithals, Cubitus valgus. FLAVELL (1943) wies in der Mitteilung eines „Turner's Syndrome in the Male“ erstmalig auf die dem Turner-Syndrom entsprechenden Mißbildungen phänotypisch-männlicher Fälle hin. Das Erscheinungsbild selbst war früher schon mehrfach beschrieben worden, am ausführlichsten wohl von GÜNTHER (1929).

Häufigkeit. Das sogenannte männliche Turner-Syndrom ist — im Gegensatz zum phänotypisch-weiblichen Turner-Syndrom — sehr selten. Ich selbst sah nur 5 Fälle, denen ich in einer früheren Arbeit (1964) 71 weitere aus dem Schrifttum zufügen konnte, einschließlich 5 nur kurz erwähnten. Darüber hinaus sind Fälle von GIRAUD u. Mitarb. (1951), SOLIS u. SCHWARTZ (1951), 3 Fälle von MIDALLA (1955), BORGHINI u. Mitarb. (1958), LAMBERT u. NETTER (1962), SACCOMANI (1962), BATTAGLIA (1963), VALENCIA u. Mitarb. (1963), HELLER (1965), ROSS u. Mitarb. (1965) und ZUPPINGER u. Mitarb. (1965) beschrieben, insgesamt also mindestens 85 Fälle. Nur um einen groben Anhalt zu haben, kann man eine Häufigkeit von 1:15 des (phänotypisch-weiblichen) Turner-Syndroms annehmen.

Klinik. Die Nosologie (1964) wurde a. o. ausführlich beschrieben. Es ist festzustellen, daß *alle* extragenitalen Mißbildungen des sogenannten männlichen Turner-Syndroms denen des phänotypisch-weiblichen Turner-Syndroms entsprechen, und zwar was die Ausbildung anbetrifft ebenso wie ihre Variabilität und Häufigkeit. Das führte dann eben zur Erkenntnis der Parallele trotz andersgeschlechtlicher Genitalbildung. Die Deformierungen sind bei den beschriebenen Fällen allerdings stärker. Wenn Beckenveränderungen und Tibiasporne — im Gegensatz zu anderen Knochenbildungen — noch nicht gefunden wurden, so dürfte bei der relativen Seltenheit dieser Befunde darin keine Abweichung zu sehen sein. Im Gegensatz zu dem eigentlichen Turner-Syndrom hat aber das sogenannte männliche Turner-Syndrom ein männliches Genitale. Die Hoden sind allerdings nur ganz rudimentär angelegt. Histologisch zeigen sie vereinzelte Samenkanälchen mit Sertoli-Zellen, bindegewebig untergegangene Kanälchen („Schatten“) und ein bindegewebig umgewandeltes Zwischengewebe mit degenerierten Leydig-Zellen (Abb. 1). Gelegentlich sind überhaupt keine Hoden auffindbar. Der Penis kann etwa normal groß sein; meist ist er ebenso wie das Scrotum rudimentär.

Hormonal sind diese Patienten schwer gestört: Sie leiden an einem Androgenmangel, die 17-Ketosteroide liegen an der unteren Grenze der Norm; die Gonadotropinausscheidung ist erhöht, gelegentlich auch normal. Es besteht also ein primärer Hodenschaden.