2. Thema: Der Hodenhochstand

C. SCHIRREN, Hamburg: Einführung

In sehr vielen Fällen wird auch der Androloge bei Hodenhochstand im Kindesalter zu Rate gezogen. Da der Androloge weiterhin fast regelmäßig bemüht wird, wenn eine Fertilitätsstörung nach vorausgegangenem Hodenhochstand aufgetreten ist, scheint die Besprechung im Rahmen eines Symposiums wichtig. Ich habe mich bei der Zusammenstellung des Programms allein von dem Gedanken leiten lassen, Ihnen ein abgerundetes Bild des Problems Hodenhochstand zu bieten. Dazu war es erforderlich, auch die Fachvertreter aus der Pädiatrie, Kinderchirurgie, Urologie und Endokrinologie zu Wort kommen zu lassen. Denn nur die Zusammenschau dieses komplexen Geschehens kann uns zu einer einheitlichen Beurteilung kommen lassen.

Um eine gewisse Einheitlichkeit in der Nomenklatur der Referenten zu erreichen, habe ich die Aufstellung in der Tabelle vorbereitet. Ich bin mir darüber klar, daß man auch andere Bezeichnungen verwenden kann; im Interesse einer einheitlichen Betrachtung war eine solche Normierung aber erforderlich.

Tabelle. *Die verschiedenen Formen des Hodenhochstandes*

- a) *Physiologischer H.H.* bei der Geburt.
- b) *Pendelhoden* im Kindesalter. Beide Hoden befinden sich im Scrotum. Bei thermischen Reizen und abnormer Erregungslage des M. cremaster kommt es zur Retraktion der Hoden bis maximal an den äußeren Leistenring. Der Zustand ist nur vorübergehend.
- c) *Gleithoden*. Normalgroßer Hoden, der sich vor dem äußeren Leistenring befindet und manuell in das Scrotum bringen läßt; er verbleibt jedoch nicht in dieser Lagerung, sondern schnell in die Ausgangsposition zurück, da der Ductus deferens zu kurz ist.
- d) *Retentio testis*. Normalentwickelter Hoden, der aufgrund eines mechanischen Hindernisses jedoch am Descensus in das Scrotum verhindert ist.
- e) *Kryptorchismus*. Ein- und doppelseitiger Befall. Ein-/beiderseits H.H., keine Möglichkeit der manuellen Verlagerung in das Scrotum. Primär fehlentwickelte Hoden.
- f) *Hodenektomie*. Normalentwickelte Hoden, die jedoch nicht die regelrechte Lagerung im Scrotum aufweisen, sondern beim Descensus von der normalen Richtung abgewichen sind.

Es liegt mir sehr daran, daß wir am Schlusse des Symposiums für unser Fach zu einer gemeinsamen Stellungnahme kommen, die ich Ihnen dann als Empfehlung bekanntgeben werde und die weiterhin den Zeitschriften zur Publikation zugeleitet werden wird. Diese Stellungnahme soll inhaltlich umfassen: Wann Hormontherapie, welche Dosierung,

wann Operation. Ganz bewußt ist für die Referenten von Literaturübersichten Abstand genommen worden, weil diese nur die gestellte Aufgabe erschweren würden. Es gilt vor allem, die eigenen Feststellungen und Ergebnisse bekanntzugeben und aus ihnen gemeinsam mit den Ergebnissen der anderen Referenten die gestellten Fragen zuverlässig zu beantworten.

R. DOEFFMER †, Bonn: Die Häufigkeit des Hodenhochstandes unter Berücksichtigung anderer Abweichungen von der Norm

Nur bei wenigen Anomalien des menschlichen Körpers finden sich wie bei den Dystopien der Hoden so unterschiedliche Untersuchungsergebnisse und vielfach widersprüchliche Ansichten, die uns bereits bei der anscheinend so einfachen Feststellung der Häufigkeit begegnen. Diese Tatsache läßt sich nur teilweise durch das verschiedenartige Krankengut, die Erfassung dieser Anomalie durch mehrere Fachgebiete, die Schwierigkeiten bei der Diagnose und vor allem die Zuordnung (Mißbildung, Fehlanlage, Entwicklungsstörung oder hormonale Insuffizienz) sowie die damit verbundene uneinheitliche Nomenklatur erklären. Die Angriffspunkte für diese Störungen von Synthese und/oder Funktion sind bis heute weitgehend unbekannt. Ein Teil dieser Anomalien ist als das Ergebnis des Zusammentreffens genetisch determinierter Anlagen (Genopathien, Gametopathien) oder häufiger als früher angenommen intrauterin wirkender Umweltfaktoren (Kyematopathien mit Störungen der Blastogene, der Embryogenese und ganz besonders der Fetogenese) aufzufassen.

In Arbeiten über Mißbildungen des menschlichen Körpers sind Dystopien vielfach überhaupt nicht aufgeführt (siehe SIEVERS) oder sie tauchen innerhalb der Mißbildungen des Urogenitalsystems unter. Nach den Mißbildungen des Zentralnervensystems sollen Mißbildungen des Urogenitalsystems am zweithäufigsten sein.

Die deutliche Abnahme des Hodenhochstandes mit zunehmendem Alter ist in der Tab. 1 aufgezeigt.

Bei Frühgeburten kommen Hodendystopien beträchtlich häufiger als bei normalen Geburten vor, so daß die Eutopie als ein nicht obligates Reifezeichen herangezogen wird.

Wir werteten die Befunde von 413707 Gemusterten des Jahrgangs 1940 aus und ermittelten eine ein- oder beidseitige Hodendystopie bei 3544 (0,86%). Vergleicht man CAMPBELLS Statistik (hier weitere Literatur) mit den Resultaten von BAUMRUCKER und unseren Ergebnissen, so ist seit 1920 eine erhebliche Zunahme zu verzeichnen. Bis 1920 ist ein langsamer und dann ein steiler Anstieg erkennbar.