(75:24:1) und Wasser/Methanol/Essigsäure (75:24:1)] und drei unpolaren [mit Wasser gesätt. Benzol und Toluol sowie Mineralgeist (mineral spirits)] Lösungsmittelsystemen bestimmt und die Flecken mit Cerammoniumnitrat markiert. In den polaren Lösungsmittelsystemen nehmen die R_F -Werte von Wasser/Dioxan/Essigsäure über Wasser/Methanol/Essigsäure zu Wasser hin ab, d. h., daß Methanol und in stärkerem Maße Dioxan als organische Lösungsmittel wirken.

J. Chromatog. **37**, 268—278 (1968). Techn. Service Dept., Reichhold Chem., Inc., Tuscaloosa, Ala. (USA). G. Peters

Die Trennung von aromatischen Sulfonsäuren mit Hilfe eines flüssigen Anionenaustauschers

J. S. Fritz und R. K. Gillette. Arylsulfonsäuren können durch Alamin 336-Hydrochloridlösungen in Toluol, aus wäßrigen Lösungen extrahiert werden. Das Extraktionsverhalten von 23 Sulfonsäuren [0,01 M in Sulfonsäure und 0,5 M in Salzsäure mit einem gleichen Volumen von 5 Vol.-% Alamin 336-Hydrochlorid in Toluol als organischer Phase] wurde untersucht und tabellarisch wiedergegeben. Die Verteilungskoeffizienten werden in Abhängigkeit von verschiedenen Chlorid-, Natriumbromid- und Perchlorsäure-Konzentrationen bestimmt. Die quantitative Trennung der Sulfonsäuremischungen ist auf Trennsäulen möglich, die mit Chromosorb W bzw. Teflon als Trägersubstanz gefüllt und mit Alamin 336 getränkt sind.

Anal. Chem. **40**, 1777—1781 (1968). Inst. Atomic Res. and Dept. Chem., Iowa State Univ., Ames, Iowa (USA).

G. Peters

Nachweis isomerer Aminobenzolsulfonsäuren nebeneinander

L. Légrádi. Orthanilsäure, Metanilsäure und Sulfanilsäure können mit Hilfe der Papier-Chromatographie nebeneinander nachgewiesen werden. Für die Erkennung sehr kleiner Beimengungen ist die Papier-Chromatographie nicht geeignet. Der Autor schlägt für diesen Zweck Farbreaktionen vor: Unter den isomeren Aminobenzolsulfonsäuren kuppelt die Orthanilsäure mit einem Diazoniumsalz im sauren Medium am schnellsten, Sulfanilsäure am langsamsten. Der größte Unterschied in der Kupplungsgeschwindigkeit wird mit dem Diazoniumsalz der Metanilsäure erzielt, womit Orthanilsäure neben den beiden anderen Isomeren nachgewiesen werden kann. Mit diazotiertem Anilin kuppelt Orthanilsäure am langsamsten und beide anderen Isomeren schnell. Dadurch gelingt der Nachweis von Metanil- und Sulfanilsäure neben Orthanilsäure. — Eine andere Methode zum Nachweis von Orthanilsäure und Metanilsäure neben Sulfanilsäure ist die farbige Löslichkeit dieser beiden Isomeren in Dimethylformamid. Den aromatischen Aminoverbindungen analog reagieren die Aminobenzolsulfonsäuren mit 2,4-Dinitrofluorbenzol. In alkoholischer Lösung, vor allem in wäßrig-alkoholischer Lösung, ist der Unterschied der Reaktionsgeschwindigkeit der Isomeren groß genug, daß Metanilsäure und Sulfanilsäure in Orthanilsäure nachgewiesen werden können. Aminobenzolsulfonsäuren geben mit HCl-KBrO₃ Farbreaktionen.

Mikrochim. Acta **1968**, 632—635. Nitrokemia-Industriewerke, Füzögyartelep (Ungarn).

F. Böhmüller

Spektrophotometrische Bestimmung von Gemischen aus Hydroxybenzoesäuren und Phenol

N. Balme und M.-F. Berny. Die Methode beruht auf den unterschiedlichen Extinktionskoeffizienten der Verbindungen

bei der Messung im Ultraviolett bei 250, 270 und 302 nm. — *Ausführung.* Es werden Probelösungen mit etwa 10^{-4} Mol/l der Verbindungen in 0,1 N Salzsäure hergestellt und gegen 0,1 N Salzsäure in Quarzküvetten von 10 bzw. 20 mm Schichtdicke bei den angegebenen Wellenlängen gemessen. Das Lambert-Beersche Gesetz ist über den gesamten Meßbereich erfüllt, so daß nach einfachen Additions-Gleichungen die Konzentrationen zu errechnen sind. Gemische mit etwa je $1,4 \cdot 10^{-4}$ Mol/l, o-, p-Benzoesäure und Phenol $2,5 \cdot 10^{-4}$ Mol/l o-, 0,8 p-Verb. und 1,8 Phenol sowie etwa $0,9 \cdot 10^{-4}$ Mol/l o-, 2,0 p-Verb. und 2,9 Phenol wurden mit einem relativen Fehler zwischen 0 und 5% im Mittel bei 2,5% analysiert.

Bull. Soc. Chim. France, Nr. 8, 3447—3448 (1968). Lab. chim. general, Fac. Scien., Lyon (Frankreich).

H. Pohl

Gas-chromatographische Identifizierung der TMS-Derivate von nichtflüchtigen phenolischen Säuren

F. C. Dallos und K. G. Koepl. Die Trimethylsilylderivate nichtflüchtiger phenolischer Verbindungen waren flüchtig und thermisch stabil und konnten gut an einer Cu-Säule mit 3% OV-1 auf 60/80 mesh Chromosorb G-HP getrennt werden. Herangezogen wurden Phenole aus *Bierextrakt*.

J. Chromatog. Sci. **7**, 565—568 (1969). J. E. Siebel Sons' Comp., Chicago, Ill. (USA).

Fa. Woelm

Berichtigung

Über den Einsatz eines Computers zur Auswertung der Bestimmung der gegenseitigen Löslichkeit von CaO und MgO in Sinterdolomiten

H. MALISSA, H. C. HORN und G. JELLINEK

Institut für Analytische Chemie u. Mikrochemie der Techn. Hochschule Wien

Diese Z. **245**, 80—83 (1969)

Tab. 1 muß richtig wie folgt lauten:

Tabelle 1. Eindringtiefen bei 20 kV Beschleunigungsspannung

Verbindung	Mol-gewicht	Mittlere Atom-nummer	Mittleres Atom-gewicht	Dichte	Ein-dringtiefe
		Z	A		d_E um
Mg	24,3	12	24,3	1,74	6,3
Ca	40,1	20	40,1	1,55	6,5
CaO	56,1	14	28,1	3,4	3,2
MgO	40,3	10	20,2	3,6	3,0
2MgO·SiO ₂	140,7	10	20,1	3,2	3,4
MgO·Fe ₂ O ₃	200,1	13,7	28,6	4,5	2,6
2CaO·SiO ₂	172,3	12,3	24,6	3,3	3,3
2CaO·Fe ₂ O ₃	271,9	14,7	38,8	4,5	3,2
CaO·MgO·SiO ₂	156,5	11,1	22,4	3,2	3,4
MgO·Al ₂ O ₃	142,3	10	20,3	3,6	3,1
3CaO·MgO·SiO ₂	268,7	12,2	24,4	3,2	3,4
SiO ₂	60,1	10	20	2,3	4,7
Al ₂ O ₃	101,9	10	20,4	3,7	3,0