noch ausstehenden neben den noch nicht besprochenen B-Vitaminen noch die Vitamine C und P behandelt werden sollten. Ob dies gelingen wird, erscheint dem Referenten zweifelhaft, da in der vorliegenden Lieferung nur vom Pyridoxin, dem Vitamin B₆ die Rede ist, ohne daß die sehr umfangreiche Literatur darüber gebracht wurde.

Bei dem heutigen stürmischen Fortschritt der Naturwissenschaft scheint es überhaupt zweifelhaft, ob ein einzelner Autor ein so großes Gebiet in einer entsprechenden Zeit bearbeiten kann. Sonst hat der Referent seine bei der Besprechung früherer Lieferungen geäußerte gute Meinung nicht zu ändern.

F. Wessely-Wien

Errata

A Method of General Applicability for the Micro Determination of Chlorine, Bromine and Iodine (Mikrochim. Acta [Wien] 1961, 420).

Professor *J. T. Stock* has drawn our attention to errors of sign in the above paper. The conditions for the titrations should be:

	Reference Electrode	Applied Potential
Single Halides	Hg Pool	— 0.15 v.
Bromide + Chloride	Calomel sat. NaNO ₃	+ 0.15 v.
Iodide + Chloride	Calomel sat. NaNO ₃	+ 0.15 v.
Iodide + Bromide + Chloride..	Calomel sat. NaNO ₃	— 0.15 v. (Iodide) + 0.15 v. (Bromide + Chloride)

Our apologies are due to many readers who may have had difficulty in interpreting our diagrams and have failed to reproduce our results.

S. Greenfield

R. A. D. Smith

I. Ll. Jones

Sensitive New Test for Formaldehyde and Pyruvaldehyde with 2-Hydroxycarbazole. By *Eugene Sawicki, Thomas W. Stanley, Henry Johnson, and Francis T. Fox* (Mikrochim. Acta [Wien] 1962, 741).

All reagent solutions are prepared with concentrated sulfuric acid. Thus "concentrated" should be substituted for "1%" in line 5 of page 742, the last line of the text of page 744, and in the heading of Table II.