the results were good or very good in 67 cases, fair in 31, and poor in 5. In the cases with fair and poor results the surgical operation performed seems to have been inadequate. Primary patellectomy should be considered in cases of femoropatellar arthrosis.

Key words: Cartilage, retropatellar, lesion of – Patellectomy, primary – Tilting, ventral (Bandi) – Chondromalacia patellae.

Zusammenfassung. Bei 112 Patienten wurden 62 Knorpelglättungen, 45 Ventralisationen nach Bandi und 5 primäre Patellektomien durchgeführt. 103 Patienten wurden durchschnittlich 1,5 Jahre nach Operation nachuntersucht. 80 % fühlten sich gebessert. Objektiv ließen sich 67 sehr gute und gute, 31 mäßige und 5 schlechte Ergebnisse feststellen. Die Analyse der unbefriedigenden Ergebnisse bestätigte mehrfach eine Überforderung der jeweiligen Operationsmethoden. Im Falle beginnender femoropatellarer Arthrose empfiehlt es sich, die primäre Patellektomie zu erwägen.

Schlüsselwörter: Retropatellarer Knorpelschaden – Chondropathia patellae – Ventralisation nach Bandi – Primäre Patellektomie.

95. Ergebnisse bei 182 operativ versorgten, distalen intraartikulären Humerusfrakturen

A. Rüter und C. Burri

Abteilung für Unfallchirurgie des Zentrums für Operative Medizin der Universität Ulm

Results of a Study of 182 Surgically Treated Patients with Distal Intra-Articular Comminuted Fractures of the Humerus

Summary. In a comprehensive statistical study conducted by the German section of ASIF, 182 patients who were surgically treated for elbow fractures according to the principles of ASIF were reexamined. The results show that a complete anatomic and, above all, functional restoration of the joint was achieved in only 30 percent of these cases: 27.5 percent of the results could be classified as very good, an additional 39.6 percent as good, 21.4 percent as moderate and 11.5 percent as poor. The relatively large number of cases in the sample permits a few conclusions and justifies drawing up guidelines for their treatment.

Key words: Fracture, humerus – Treatment, operative – Results.

Zusammenfassung. In einer Sammelstatistik der Deutschen Sektion der AO International wurden 182 nach den Prinzipien der AO operativ versorgte Ellbogenfrakturen nachkontrolliert. Die Resultate zeigen, daß eine vollständige anatomische und vor allem funktionelle Wiederherstellung des Gelenkes in knapp 30% der Fälle erreicht werden kann. 27,5% der Resultate konnten als sehr gut, weitere 39,6% als gut, 21,4% als mäßig und 11,5% mußten als schlecht klassifiziert werden. Die relativ große Fallzahl erlaubt einige Schlußfolgerungen und berechtigt, entsprechende Richtlinien zur Behandlung dieser Frakturen aufzustellen.

Schlüsselwörter: Distaler Humerus – Frakturen – Behandlung – Ergebnisse.