120. Technik der Ileostomie und Colostomie

K. Junghanns

Chirurgische Universitätsklinik Heidelberg

Surgical Technique for Ileostomy and Colostomy

Summary. Colostomy in the transverse colon is a simple and safe procedure for immediate decompression. Permanent colostomy, on the other hand, requires accurate preoperative examination of the patient in different postures to mark the ideal spot for easy placement of bags. The colostomy should not be too close to bone, scars, umbilicus or skin folds. Later management is facilitated if it is well vascularized and sutured without tension protruding above the skin level.

Key words: Colostomy – Ileostomy – Colostomy: Care.

Zusammenfassung. Zur Anlage eines doppelläufigen Anus praeter wird der Dickdarm über einem Reiter vor der Bauchwand fixiert und nach einigen Stunden eröffnet. Beim endständigen Anus praeter und bei der Ileostomie muß der Anlageort am Patienten vor der Operation in verschiedenen Körperlagen markiert werden, um einen versorgungsfähigen Abstand von Nabel, Narbe und Beckenkamm zu halten. Auch Hautfalten müssen berücksichtigt werden. Wenn der Darm die Haut ausreichend überragt, gut durchblutet ist und spannungsfrei fixiert wurde, bereitet die spätere Versorgung keine Schwierigkeiten.

Schlüsselwörter: Colostomie – Ileostomie – Anus praeter-Versorgung.