Zusammenfassung. Es wird über einen 48-jährigen Patienten berichtet, der seit Geburt unter multiplen chondrodysplastischen Skeletveränderungen und einem riesenhaften Osteochondrom der rechten lateralen Thorax- und Bauchwand litt. Der Tumor hatte seinen Ursprung zwischen der 10. und 11. Rippe und infiltrierte in die Zwerchfell- und Bauchwandmuskulatur. Nach Resektion wurde zur Deckung der Defekte eine Plastik mit lyophilisierter Dura erforderlich. Das Krankheitsbild wird im Zusammenhang mit dem Ellis van Creveld-Syndrom diskutiert.

Schlüsselwörter: Generalisierte cartilaginäre Exostosen – Brustwandtumor – Ellis van Creveld.

124. Spätergebnisse bronchoplastischer Lungenresektion

José Mollinedo und Dieter Krumhaar

Lungenklinik Havelhöhe, Berlin

Late Results of Bronchoplastic Resections

Summary. The report deals with 31 bronchoplastic resections. The indications were carcinoma (25 cases), benign strictures (5), neurogenic myoblastoma (1). In the authors experience all main bronchi can be anastomosed, and up to now they have performed 10 different anastomoses. Chromium catgut was by far the best suture material: this caused no extensive granulations or foreign body reaction, and no suture mycosis. There was no need to cover the anastomosis. Postoperative mortality was zero. Late results are good: 20 patients are still alive from 1 to 6 years after the operation (6 benign cases). Regular checks by bronchoscopy showed good healing and no stenoses.

Key words: Resection, bronchoplastic.

Zusammenfassung. Bericht über 31 Bronchusplastiken der Lungenklinik Havelhöhe, Berlin, wegen Ca. (25 Fälle), spezif. Bronchusstrikturen (4), unspezif. Bronchusstenose (1), Granularzellenmyoblastom (1). Aufgrund unserer Erfahrung lassen sich alle Hautbronchien anastomosieren. Es wurden 10 verschiedene Anastomosen durchgeführt. Chromcatgut erwies sich als bestes Nahtmaterial: Vermeidung von Granulationsbildung und Stenosierung, Eliminierung von Nahtmykosen. Die Deckung der Anastomose war überflüssig. Eigene Frühmortalität: 0. Spätergebnisse: nach 1–6 Jahren leben 20 Patienten (davon 6 mit gutartigen Grundliden). Regelmäßige Bronchoskopiekontrollen ergaben ausgeheilte Anastomosen ohne Stenosierung.

Schlüsselwörter: Bronchoplastische Anastomosen.