Zusammenfassung. Zur operativen Behandlung der habituellen Schulterluxation sind im Schrifttum zahlreiche Methoden angegeben worden. Diese Anzahl von Verfahren ist Beweis dafür, daß keine von diesen Methoden optimale Ergebnisse erbracht hat. Hier ist nicht allein die Methode als solche, sondern die Art der Durchführung der jeweiligen Operationsverfahren für Erfolg und Mißerfolg verantwortlich. In diesem Film wird die von uns seit Jahren mit Erfolg durchgeführte Operationsmethode nach Eden-Hybinette bei vorderem und hinterem Zugang während der Operation und auch als Trickzeichnung vorgeführt.

Schlüsselwörter: Habituelle Schulterluxation.

158. „Lympho-digestive Galleableitung an der Leberpforte“ bei nicht korrigierbarer extrahepatischer Gallengangsatresie

P. Schweizer, A. Flach, R. Bähr und H.-J. Kolb

Chirurgische Universitätsklinik Tübingen, Kinderchirurgische Abteilung

Lympho-Digestive Bile Drainage at the Porta Hepatis in Irreparable Extrahepatic Biliary Atresia

Summary. In cases of complete biliary atresia, bile is drained from the liver in the hepatic lymph at the porta hepatis. The method of lympho-digestive bile drainage takes advantage of this fact. The peritoneum is removed at the porta hepatis and the hepato-duodenalligament, and both are connected with a jejunal segment from which the peritoneum has been removed in the same way. The lymphatics of the two structures will then form an anastomosis, and in the intestinal wall bile can be transported into the intestinal lumen. The principles of a surgical operation are demonstrated and the results of clinical treatment pointed out.

Key words: Hepato-Porto-Jejunostomy.

Zusammenfassung. Beim kompletten Gallengangsverschluß wird Galle in der hepatischen Lymphe an der Leberpforte aus der Leber abgeleitet. Die Methode der lympho-digestiven Galleableitung nützt dieses Prinzip. Leberpforte und Lig. hepatoduodenale werden deserosiert und mit einem deserosierten Jejunumsegment verbunden. Danach anastomieren die Lymphwege beider Strukturen. In der Darmwand kann Galle ins Darmlumen transportiert werden. Operationsmethode und klinische Ergebnisse werden demonstriert.

Schlüsselwörter: Hepato-Porto-Jejunostomie.