203. Die Onkochirurgie der Ohrmuschel

H. Weerda

Universitäts-HNO-Klinik Freiburg, Killianstraße 5, D-7800 Freiburg

Tumour Surgery of the Auricle

Summary. With surgery controlled by microscope we have reduced the frequency of ablatio auris in favor of partial resection. We have developed a transpositional rotation flap and a double rotation flap to cover the defects of the auricular region 4–5 days after resection. If possible, we reconstruct the anterior and posterior auricle in one stage using a rib cartilage as support. Some examples are given.

Key words: Auricle, tumour surgery – Bi-lobed flaps – Transpositional rotation flap – Double rotation flap.

Zusammenfassung. Es wird auf verschiedene Möglichkeiten der Rekonstruktion eingegangen. Mit der mikroskopisch kontrollierten Tumorchirurgie können größere Teile der Ohrmuschel erhalten werden. Wir bevorzugen die sekundäre Rekonstruktion am 4.–5. Tag. Für diese Art der Rekonstruktion haben wir einen „Transpositions-Rotationslappen“ entwickelt. Über ein defektfüllendes Rippenknorpelgerüst werden Vorder- und Rückseite der Ohrmuschel rekonstruiert.

Schlüsselwörter: Ohrmuschel – Onkochirurgie – Mikroskopisch kontrollierte Chirurgie – Bi-lobed Flap – Transpositions-Rotationslappen – Doppelrotationslappen.