13 Monate. Dieses Verhältnis war auch in den Child-Stadien II und III in beiden Gruppen vorzufinden. Sklerosierte Patienten leben im Mittel $3 \times$ länger als konservativ therapierte Patienten. An beiden Zentren ist die Sklerosierungstherapie das Verfahren der Wahl.

Schlüsselwörter: Oesophagusvaricenblutung – Lebercirrhose – Sklerosierungstherapie.

264. Spätergebnisse der endoskopischen Wandsklerosierung der Speiseröhre wegen akuter und rezidivierender Oesophagusvaricenblutung

K.-J. Paquet, H. Feußner und P. Koussouris

Chirurgische Universitätsklinik Bonn und Department für Chirurgie und Gefäßchirurgie der Heinz-Kalk-Klinik Bad Kissingen, Am Gradierwerk, D-8730 Bad Kissingen

Late Results of Endoscopic Esophageal Sclerotherapy in Acute and Recurrent Variceal Hemorrhage

Summary. From January 1, 1969 to December 1, 1982 in the Department of Surgery at Bonn University and the Heinz Kalk Clinic, Bad Kissingen, a total of 1,199 patients were treated for variceal hemorrhage with endoscopic paravariceal esophageal sclerotherapy. In 90 % liver cirrhosis was the underlying disease. The sclerotherapy was performed 386 times as emergency and 737 times as elective treatment. In 1980 a prospective randomized control study was performed in 43 patients to compare the effect of emergency treatment of variceal bleeding with a Sengstaken tube to endoscopic sclerotherapy. In 93 % of cases the hemorrhage was stopped; admission mortality was 15 %. Of all treated patients 94 % were followed up and reinjected if necessary; 60 % of them were still alive on December 1, 1982 and the 5-year life expectancy was 50 %. Endoscopic paravariceal sclerotherapy was greatly superior to the Sengstaken tamponade as emergency treatment for acute variceal hemorrhage.

Key words: Late results – Endoscopic sclerotherapy – Bleeding of esophageal varices.

Zusammenfassung. Vom 1. 1. 1969 – 1. 12. 1982 wurden in der Chirurgischen Universitätsklinik Bonn und der Heinz-Kalk-Klinik Bad Kissingen 1199 Patienten wegen Oesophagusvaricenblutung durch endoskopische Wandsklerosierung der Speiseröhre behandelt. Grundleiden war in 90 % eine Lebercirrhose. Bei 386 Kranken erfolgte eine notfallmäßige, bei 737 eine elektive Sklerosierung. 1980 wurde bei 43 eine prospektive kontrollierte randomisierte Studie vorgenommen, die die Doppelballonsondebehandlung der akuten Blutung mit der Therapie durch Wandsklerosierung verglich. – Die Blutstillungsquote bei Akutpatienten betrug 93 %; die Klinikletalität aller 3 Gruppen machte 15 % aus. 94 % aller Patienten konnten im weiteren Verlauf überwacht und falls erforderlich resklerosiert werden. Am 1. 12. 1982 lebten noch 60 %; die Fünfjahresüberlebenszeit macht 50 %. – Die Wandsklerosierung war der Anwendung der Doppelballonsonde bei der Therapie der akuten Oesophagusvaricenblutung signifikant überlegen.

Schlüsselwörter: Spätergebnisse – Oesophaguswandsklerosierung – Varicenblutung.

265. Choledocholithiasis – endoskopische Sphincterotomie der Papilla Vateri

K. Schwamberger

II. Universitäts-Klinik für Chirurgie, Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck

Choledocholithiasis – Endoscopic Sphincterotomy of Vater's Papilla

Summary. Since endoscopic methods permit a sphincterotomy of Vater's papilla to be performed, this technique has rightly found a place in the treatment of choledocholithiasis. The papillotomy is a form of biliodigestive anastomosis which, according to present-day evidence, is the most favourable form, since it drains the biliary duct system at the deepest point. We use this endoscopic method in cases of choledocholithiasis after cholecystectomy on patients over 60 years of age when the operative risk is high.

Key words: Choledocholithiasis – Endoscopic sphincterotomy.

Zusammenfassung. Auf endoskopischem Wege ist eine suffiziente Aufspaltung der Papilla Vateri und damit eine Behandlung der Choledocholithiasis möglich. Eine Sphincterotomie ist eine Form einer biliodigestiven