5,79 Proc. Sauerstoff zur Oxydation der Verunreinigungen verbraucht. Die einzig möglichen Verunreinigungen des Essigäthers sind aber Wasser und Alkohol, und da 100 Theile des letzteren 69,56 Theile Sauerstoff zur Oxydation verlangen, so entsprechen 5,79 Sauerstoff 8,33 Proc. Alkohol.

Die Zusammensetzung des Essigäthers war also:

Essigäther . . .	90,03 Proc.
Alkohol . . .	8,33 »
Wasser . . .	1,64 »

In gleicher Weise kann auch eine Alkoholbestimmung im Spiritus ausgeführt werden. 0,7036 Grm. Spiritus wurden mit 64,03 Grm. der titrirten Chromsäurelösung behandelt und schliesslich für den verbrauchten Sauerstoff eine Kohlensäuredifferenz von 2,3494 Grm. gefunden, aus welcher sich $2,3494 \times \frac{100 \times \frac{2}{11}}{0,7036} = 60,7$ Proc. Sauerstoff berechnen.

Da 100 The. absoluter Alkohol 69,56 Proc. Sauerstoff verlangen, so entsprechen 60,7 Proc. Sauerstoff $(69,56 : 60,7 = 100 : x)$ 87,26 Procent Alkohol.

Chapman hebt schliesslich hervor, dass durch die beschriebene Methode, und nur durch sie, am ehesten die Zusammensetzung vieler organischer Körper, wie Chinin, Thein, Morphin, ätherische Oele etc. erforscht werden kann.

Oxydation der Ameisensäure durch Chromsäure. Da die Ameisensäure sehr häufig als Oxydationsproduct organischer Stoffe auftritt, so war es von Wichtigkeit ihr Verhalten gegen Chromsäurelösung zu prüfen. E. T. Chapman *) hat auch diese Versuche ausgeführt und gefunden, dass die Ameisensäure der Einwirkung der Chromsäurelösung nicht widerstehen kann, sondern dadurch zu Kohlensäure und Wasser oxydirt wird. 11,5342 Grm. ameisenaurer Baryt lieferten in bekannter Weise behandelt 4,471 Grm. Kohlensäure, entsprechend 38,762 Proc., während die Rechnung 38,767 Proc. verlangt. Die Ameisensäure macht demnach von den anderen Gliedern der Essigsäurereihe, welche nach den Untersuchungen Chapman's der oxydirenden Wirkung der Chromsäurelösung hartnäckig widerstehen sollen, eine beachtenswerthe Ausnahme.

*) Journ. of. the Chemic. Society Vol. 5, pag. 289.