Natron basisches Salz zu bilden. Ist einmal auf diese Weise der Harn alkalisch oder schwach sauer geworden, dann beginnt auch die weitere Zersetzung desselben unter Einwirkung der Pilze und greift rasch um sich. — Die Ursache der Bildung der Harnsäuresedimente wird somit in jedem speciellen Falle leicht zu finden sein; es handelt sich um Processe, die in jedem Harn vor sich gehen und nur manchmal schneller verlaufen, was aber bei ganz normalem Körper ebenso geschehen kann, wie bei erkranktem.

Ueber das Urocyenin. Versetzt man nach den Untersuchungen von Dr. Parisel*) gesunden normalen Urin mit einer sehr kleinen Menge von phenylsaurem Ammon, so giebt derselbe auf Zusatz von Salpetersäure eine schöne blaue Farbe, welche ganz dieselben chemischen Reactionen zeigt, wie der pathologische Farbstoff, welchen Parisel während der letzten Choleraepidemie in Paris in dem Urin der Cholerakranken bemerkte und welchen derselbe als Urocyenin bezeichnete. Diese Färbung ist um so merkwürdiger, als eine wässrige Lösung von phenylsaurem Ammon nach Zusatz von Salpetersäure eine von der obengenannten ganz verschiedene Reaction zeigt. Ersetzt man das phenylsaure Ammon durch Anilin, so färbt sich der normale Urin bei Gegenwart von Salpetersäure roth und nicht blau. Sollte sich bei der schnellen Zersetzung des cholerischen Harns phenylsaures Ammon bilden?

Quantitative Stickstoffbestimmung im Urin. Nach C. Voit **) verfährt man zur Bestimmung des gesammten Stickstoffgehaltes des Harns am besten in folgender Weise. In ein ganz flaches Porzellanschälchen von etwa 8 Cm. Durchmesser, auf dessen breiten Rand ein Glasdeckel aufgeschliffen ist, bringt man ausgeglühten feinen Quarzsand und wiegt darauf den ganzen Apparat. Aus einer kleinen genau calibrirten Pipette lässt man alsdann 5 CC. Harn auf das Quarzpulver, welches in solcher Menge vorhanden sein muss, dass es die Flüssigkeit völlig aufsaugt, fließen und wiegt zur Controle der Messung noch einmal. Das unbedeckte Schälchen kommt nun unter die Glocke einer grossen Luftpumpe und in wenigen Stunden ist die zusammengebackene Masse so trocken, dass man sie mit einem breiten Messerrücken durch Abschaben fein pulvern und von den Wänden der Schale loslösen kann.

*) Aus Moniteur scientifique durch Neues Jahrbuch f. Pharm. Bd. 28, p. 29.

**) Zeitschrift für Biologie Bd. 1, p. 115.