Berichtigung zu meiner Arbeit: Die Winkelverteilung der Intensität von Ramanlinien.

Von **D. P. Ray-Chaudhuri.**

(Eingegangen am 10. Januar 1932.)

In der angegebenen Arbeit¹⁾ wird fälschlich angegeben, daß die Ramanlinie 4617 des Benzols demselben Verteilungsgesetz folge, wie die beiden anderen Linien 4215 und 4555 Å. Die Intensität des Lichtes, das gegen den einfallenden Strahl unter einem Winkel Θ gestreut wird, beträgt

$$I = J \left\{ \left(1 + \frac{\varrho}{2 - \varrho} \right) (1 + \cos^2 \Theta) + \frac{2\varrho}{2 - \varrho} \sin^2 \Theta \right\},$$

wo ϱ den Depolarisationsfaktor für senkrechte Beobachtung und J die Intensität längs der Richtung bedeuten, die senkrecht auf der Ebene des einfallenden und gestreuten Strahles liegt. Die Linie 4617 hat zwei Komponenten, die mit dem benutzten Instrument nicht aufgelöst wurden. Von den beiden ist für die schwächere $\varrho = 1$. Eine solche Linie zeigt keine Winkelabhängigkeit der Intensität. Die Intensitätsverteilung der betrachteten Linie ist durch die obige Formel mit $\varrho = 0,4$ gegeben, wenn man den ungleichen Verlust durch Reflexion des einfallenden Lichtes für die beiden Komponenten berücksichtigt. Dieser Wert liegt etwas höher als der von Bhagabantam²⁾ gefundene, der $\varrho = 0,35$ erhielt. Bei seinen Polarisationsmessungen verhielten sich die Belichtungszeiten für die π - und σ -Komponente wie 5 : 3. In diesem Falle muß man die Schwarzschildsche Korrektur anbringen, die näher bei 0,9 als bei 1,0 liegt. Bhagabantam gibt nicht an, ob diese Korrektur angebracht wurde. Sollte das nicht der Fall sein, so würde das eine Annäherung unserer Werte bedeuten.

¹⁾ D. P. Ray-Chaudhuri, ZS. f. Phys. **72**, 242, 1931.

²⁾ S. Bhagabantam, Ind. Journ. Phys. **5**, 603, 1930.