nicht fehl in der Deutung, diese Anzeichen als Ausdruck eines vom Verschuß ausgehenden und solange wie dieser anhaltenden Schockzustandes anzusprechen. Bestärkt werden wir in dieser Annahme dadurch, daß die Sympathektomie ebenso wie die Lokalanästhesie der Klemmstelle die Ileusauswirkungen der 3 Beobachtungsgebiete inhibiert. Ziehen wir die histologischen Ergebnisse der Leber, Niere, Nebenniere und Lunge noch hinzu, die beim Darmverschuß gleiche Veränderungen wie beim Schock anderer Genese aufweisen (EUFINGER, MOON-MORGAN, DELORME, ELMAN, SEULBERGER), so schließt sich der Kreis unserer Betrachtungen (Abb. 14). Es erklärt sich nun auch, warum diese Schockbilder die gleichen Entgleisungen wie der Darmverschuß aufweisen.

Vorsitzender E. v. REDWITZ-Bonn: Ich danke Herrn REIFFERSCHIED für die Mitteilung seiner schönen und mühevollen Versuche, die mir aber imstande scheinen manche unserer Vorstellungen über die patho-physiologischen Verhältnisse beim Ileus wesentlich zu korrigieren.

Berichtigung.

Im Kongreßbericht 1951 (Band 270) ist die Diskussionsbemerkung von Professor FROMME zum Vortrag IV (S. 84) irrtümlich bei der Aussprache zu Vortrag LVII (S. 442) aufgeführt.

Die Ausführungen von Absatz 2 bis Ende gehören demnach auf Seite 84.